

Nombre: Mometasona Crema o loción al 0,1%

Condición de venta: con receta médica

Clasificación: antiinflamatorio tópico

Disponible en:

Nombres de marca:

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:** al 0,1% en crema o loción

- **Principio Activo:** mometasona

- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis que responden a corticoesteroides, como psoriasis y dermatitis atópica.

2.- Administración (tópico)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de:

Crema:

Debe aplicar una capa fina de crema sobre la zona afectada. Debe lavar sus manos antes y después de cada aplicación.

Solución:

Aplicar unas gotas de solución , una vez al día a las áreas cutáneas afectadas, masajear suave y profundamente hasta hacer desaparecer la loción

Debe evitar el contacto del medicamento con los ojos, o en otras mucosas.

No debe colocar vendajes o gasas sobre la zona afectada, a menos que su médico lo indique.

- Uso prolongado

No lo use por periodos prolongados de tiempo y/o en áreas extensas de la piel sin control médico

Evite usarlo en zonas cercanas a los ojos y en el rostro en general, sobre zona genital o rectal y en pliegues de la piel.

Si los síntomas empeoran después de unos días de tratamiento, consulte nuevamente con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Estos pacientes son mas sensibles a los efectos adversos del medicamento, el médico debe ir evaluando cuidadosamente la cantidad a aplicar y la frecuencia.

- Embarazo

Este medicamento, usado correctamente, en la cantidad y frecuencia recomendada por su médico, es poco probable que cause daño al **feto**. Si usted estando embarazada, lo usa en grandes cantidades y / o por periodos de tiempo prolongado, puede dañar el **feto** .

- Lactancia

No se ha reportado que cause daño al lactante. No debe aplicar este medicamento en los pechos antes de amamantar al niño.

- Lactantes y niños

Se debe evitar aplicar en áreas extensas de la piel o por periodos prolongados de tiempo, el pediatra debe evaluar la necesidad de usar este medicamento en su niño.

- Precauciones especiales

No debe utilizar este medicamento para el tratamiento de **acné**, quemaduras, infecciones o desordenes de pigmentación.

4. - Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

En caso de presentar reacciones alérgicas a mometasona u otro **corticoides**.

Sobre lesiones que se encuentren infectadas.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: no debe aplicar, junto a hidrocortisona y a preparaciones que contengan alcohol sobre la zona afectada.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de usar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **varicela, herpes simple, herpes zoster, tuberculosis**.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: aparición de estrías, irritación, picazón, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sequedad y descamación de la piel, cambios del color de la piel, excesivo crecimiento de pelo en la zona, sensación de quemazón y picor en la piel, disminución del espesor de la piel.

7. - Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.