

MEMANTINA CLORHIDRATO SOLUCION PARA GOTAS ORALES 10 mg/ml, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico

COMPOSICIÓN:

Cada ml de solución contiene:

Memantina clorhidrato clorhidrato: 10 mg

Excipientes: Según lo aprobado en Registro.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

USOS

¿Para que se utiliza memantina clorhidrato?:

Memantina clorhidrato se utiliza para en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Alzheimer de moderadamente grave a grave.

La pérdida de memoria se debe a una alteración en las señales del cerebro. El cerebro contiene los llamados receptores NMDA que participan en la transmisión de señales nerviosas, importantes en el aprendizaje y la memoria. Memantina clorhidrato pertenece al grupo de medicamentos llamados antagonistas de los receptores NMDA. Memantina clorhidrato actúa sobre estos receptores mejorando la transmisión de las señales nerviosas y la memoria.

Antes de tomar Memantina clorhidrato:

Antes de tomar Memantina clorhidrato es importante que lea las siguientes secciones y comente con su médico cualquier pregunta que le pueda surgir .

CONTRAINDICACIONES:

No tome memantina clorhidrato:

Si presenta hipersensibilidad (es alérgico) a la Memantina clorhidrato o a cualquiera de los componentes del medicamento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES EN EL EMPLEO

Tenga especial cuidado:

Si tiene antecedentes de crisis epilépticas (ataques convulsivos).

Si ha sufrido recientemente un infarto de miocardio (ataque al corazón), si sufre enfermedad cardíaca congestiva o si tiene la presión arterial elevada sin supervisión médica.

En las situaciones anteriores, el tratamiento debe ser supervisado con atención y el médico debe evaluar regularmente el beneficio clínico de memantina clorhidrato.

Si padece insuficiencia renal moderada, su médico debe controlar atentamente la función renal y, en función de esta, adaptar las dosis de memantina clorhidrato. No se recomienda la utilización de memantina clorhidrato en pacientes con insuficiencia renal grave.

Se debe evitar el uso concomitante de medicamentos que contengan amantadina, ketamina, dextrometorfano y otros antagonistas de NMDA.

No se recomienda memantina clorhidrato en niños y adolescentes menores de 18 años.

Toma de memantina clorhidrato con los alimentos y bebidas:

Debe informar a su médico si recientemente ha cambiado o tiene la intención de cambiar su dieta de manera sustancial (por ejemplo de dieta normal a dieta vegetariana estricta) o si sufre

de estados de acidosis tubular renal (ATR, exceso de sustancias productoras de ácido en la sangre debido a una disfunción renal) o infecciones graves del tracto urinario, ya que su médico puede tener que ajustar la dosis del medicamento.

Embarazo:

Informe a su médico si está embarazada o si tiene intención de estarlo. No se recomienda el uso de Memantina clorhidrato en mujeres embarazadas.

Lactancia:

Las mujeres que toman memantina clorhidrato deberían suspender la lactancia natural.

Conducción y uso de maquinarias:

Su médico le informará si su enfermedad le permite conducir y usar maquinarias con seguridad. Asimismo, memantina clorhidrato puede alterar su capacidad de reacción, por lo que la conducción o el manejo de maquinarias pueden resultar inapropiados.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, memantina clorhidrato puede tener efectos adversos, los que generalmente los son de leves a moderados. Los eventos adversos mas frecuentes (frecuencia del 2% o menor) son alucinaciones, confusión, vértigo, dolor de cabeza y fatiga. Otros eventos adversos poco frecuentes son ansiedad, hipertonia (tono muscular elevado), vómitos, infecciones vesicales (de orina) y aumento del instinto sexual.

Si ha sufrido crisis epilépticas, existe una posibilidad ligera que memantina clorhidrato aumente la probabilidad de sufrir otra.

Si observa eventos adversos no mencionados en este prospecto, comuníquese por favor a su médico.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCION:

Toma de otros medicamentos:

Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Los efectos de los siguientes medicamentos pueden variar con la administración de memantina clorhidrato® y su médico puede tener que ajustar las dosis:

- amantadina, ketamina, dextrometorfano
- dantroleno, baclofeno
- cimetidina, ranitidina, procainamida, quinidina, quinina, nicotina
- hidroclorotiazida (o cualquier combinación con hidroclorotiazida)
- anticolinérgicos (sustancias generalmente utilizadas para tratar desórdenes en la motilidad o espasmos intestinales)
- anticonvulsivantes (sustancias utilizadas para prevenir y eliminar convulsiones)
- barbitúricos (sustancias generalmente utilizadas para inducir el sueño)
- agonistas dopaminérgicos (sustancias como L-dopa, bromocriptina)
- neurolépticos (sustancias utilizadas en el tratamiento de enfermedades mentales).

Si ingresa en un hospital, hágale saber a su médico que está tomando memantina clorhidrato .

COMO TOMAR MEMANTINA CLORHIDRATO :

Siempre tome memantina clorhidrato tal como su médico se lo ha indicado. para obtener el beneficio de su medicamento debe tomarlo regularmente todos los días. Debe consultar a su médico si tiene alguna duda.

Los comprimidos se deben tragar con un poco de agua. Los comprimidos se pueden administrar con o sin alimentos.

POSOLÓGIA:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos mayores de 18 años: La dosis diaria máxima es de 20 mg al día. Con el objeto de disminuir el riesgo de sufrir efectos adversos, la dosis de mantenimiento se consigue aumentando 5 mg por semana durante las 3 primeras semanas de la siguiente forma: El tratamiento debe comenzarse con 5 mg diarios (la mitad de un comprimido o 10 gotas por la mañana) durante la primera semana. En la segunda semana se recomienda 10 mg al día (la mitad de un comprimido o 10 gotas dos veces al día) y en la tercera semana se recomiendan 15 mg al día (un comprimido o 20 gotas por la mañana y la mitad de un comprimido o 10 gotas por la tarde) A partir de la cuarta semana, se puede continuar con el tratamiento a la dosis de mantenimiento recomendada de 20 mg al día (un comprimido o 20 gotas dos veces al día).

Los comprimidos se pueden administrar con o sin alimentos.

Ancianos: Basándose en estudios clínicos, la dosis recomendada para los pacientes mayores de 65 años es de 20 mg al día (un comprimido o 20 gotas dos veces al día), tal como se describe anteriormente.

Insuficiencia renal: En pacientes con función renal normal a débilmente no es necesario disminuir la dosis. En pacientes con insuficiencia renal la dosis diaria se debe reducir a 10 mg al día. No se dispone de datos en pacientes con insuficiencia renal grave

ADMINISTRACIÓN:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

Continúe tomando memantina clorhidrato mientras beneficie a su salud y no experimente ningún efecto secundario inaceptable. El médico debe evaluar su tratamiento periódicamente.

SOBREDOSIS

Si Usted toma más memantina clorhidrato del que debiera se puede presentar un incremento de los efectos adversos.

Si toma una sobredosis de memantina clorhidrato, póngase en contacto con su médico.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología.

Se deben tomar medidas generales de soporte y el tratamiento debe ser sintomático.

Si olvida tomar memantina clorhidrato :

Si se da cuenta que olvidó tomar su dosis de memantina clorhidrato, espere y tome la próxima dosis a la hora habitual.

No tome una dosis doble para compensar la dosis que olvidó.

PERIODO DE VALIDEZ :

Según lo aprobado en Registro

PRESENTACIÓN

Según lo aprobado en Registro

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Según lo aprobado en Registro.

Al igual que otros medicamentos mantener fuera del alcance de los niños.

REVISADO EL 17 DE ENERO DEL 2007

