

**Lea cuidadosamente todo este folleto antes de utilizar este medicamento.**

- Guarde este folleto. Puede necesitar leerlo nuevamente.
- Si tiene alguna pregunta adicional, consúltelo a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento ha sido recetado únicamente para usted y no debiera dárselo a otras personas. Podría ser peligroso para ellos, incluso si tienen los mismos síntomas que usted.

**En este folleto:**

1. QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA ESTE MEDICAMENTO
2. ANTES QUE SE ADMINISTRE DECANOATO DE NANDROLONA
3. CÓMO SE ADMINISTRA DECANOATO DE NANDROLONA
4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
5. ALMACENAMIENTO DEL DECANOATO DE NANDROLONA.

DECANOATO DE NANDROLONA 50 mg/mL, solución oleosa inyectable

- La sustancia activa es: decanoato de nandrolona 50 mg por mL
- Los otros ingredientes son : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**1. QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA ESTE MEDICAMENTO**

Este medicamento pertenece al grupo de fármacos conocidos como esteroides anabólicos.

Estos fármacos ayudan a reconstruir los tejidos que se han debilitado debido a continuas enfermedades o graves lesiones. Además puede utilizarse para aumentar la masa corporal magra en los casos de balance de nitrógeno negativo.

Este medicamento puede también utilizarse para incrementar la masa ósea en caso de osteoporosis (pérdida de tejido óseo)

**2. ANTES QUE SE ADMINISTRE ESTE MEDICAMENTO****No utilice este medicamento...**

- Si está embarazada o piensa que puede estar embarazada
- Si es varón con cáncer de próstata o cáncer mamario
- Bajo los 3 años de edad

- Si es hipersensible al decanoato de nandrolona o a cualquiera de los excipientes.

### **Tenga especial cuidado**

Si nota cualquier signo de masculinización (por ejemplo, voz ronca o crecimiento de pelo facial), consulte a su médico.

Se requiere una supervisión extra de parte de su médico en el tratamiento de niños, puesto que los esteroides anabólicos pueden resultar en un crecimiento estatural incompleto.

En algunos otros casos también pueden ser necesarios controles médicos. Por lo tanto, dígame a su médico si ha tenido alguna vez o aún sufre de:

- Cáncer mamario con diseminación en los huesos
- Enfermedad hepática, tal como ictericia
- Enfermedad renal
- Enfermedad cardíaca
- Diabetes mellitus.
- Presión arterial alta
- Migraña, dolores de cabeza

### **Uso de este medicamento con alimento y bebida.**

El DECANOATO DE NANDROLONA puede administrarse intramuscularmente sin tomar en consideración las comidas y las bebidas.

Para que este medicamento trabaje correctamente reconstruyendo los tejidos debilitados debido a lesiones o enfermedades, es importante que siga estrictamente cualquier posible medida dietaria indicada por su médico o nutricionista.

### **Embarazo**

Si está embarazada o piensa quedar embarazada: no utilizar este medicamento.

### **Lactancia**

No utilice este medicamento si está amamantando.

**Conducción y uso de máquinas**

Hasta lo que se conoce este medicamento no afecta la capacidad de conducir y de usar máquinas.

**Uso de otros medicamentos**

Otros medicamentos pueden influenciar el efecto de DECANOATO DE NANDROLONA o el DECANOATO DE NANDROLONA puede afectar a otros medicamentos. Por lo tanto, dígame a su médico si está usando (o va a usar) insulina u otros antidiabéticos (medicamentos para controlar los niveles de azúcar en la sangre), eritropoyetina (medicamento para reducir la anemia) o medicamentos para reducir la coagulación de su sangre, ya que este medicamento puede permitir reducir las dosis de estos medicamentos.

**Uso inapropiado.**

El abuso de andrógenos (esteroides anabólicos) para aumentar la capacidad en los deportes trae consigo serios riesgos para la salud por lo que debe ser desalentado.

**3. CÓMO SE ADMINISTRA**

**Cuánto.** La dosificación depende de la severidad de su enfermedad y la respuesta al tratamiento. Su médico hallará la dosis correcta para Usted. Usualmente, una inyección cada 3 semanas es suficiente.

**Cómo se administran las inyecciones.** Las inyecciones se administran en un músculo (por ejemplo en la nalga, parte superior de la pierna o del brazo) en forma profunda.

Si tiene la impresión que el efecto de DECANOATO DE NANDROLONA es demasiado fuerte o demasiado débil cuénteles a su médico tan pronto como sea posible.

**Si utiliza más DECANOATO DE NANDROLONA del que debiera (Sobredosis):**

Si puede haber usado más DECANOATO DE NANDROLONA, entonces debe contactar inmediatamente a su médico o químico farmacéutico.

**Si olvidó de colocarse su inyección de DECANOATO DE NANDROLONA:**

Para compensar la dosis individual olvidada no debe inyectarse una dosis doble.

**Los efectos cuando se suspende el tratamiento con DECANOATO DE NANDROLONA:**

Los niveles de DECANOATO DE NANDROLONA declinan gradualmente en 2-4 semanas. Estos efectos no se detienen inmediatamente después de la discontinuación, pero a partir de entonces disminuirán gradualmente.

**4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS**

Como todos los medicamentos, el DECANOATO DE NANDROLONA puede tener efectos secundarios.

Dependiendo de la dosis, la frecuencia y el período total de administración del DECANOATO DE NANDROLONA, pueden ocurrir los siguientes efectos no deseados:

- Retención de líquidos en los tejidos, caracterizado usualmente por hinchazón de tobillos o pies o presión arterial aumentada.
- Acné, irritación cutánea
- Deseo sexual incrementado
- Náuseas
- Picazón
- Alteración de la glucosa sanguínea, hemoglobina o lípidos sanguíneos.
- Función hepática anormal
- Cambios en la anatomía del hígado
- Ronquera
- Cambios de la voz
- Pelo corporal o facial aumentado
- Menstruación irregular (o ausencia completa de la menstruación)
- Aumento de tamaño del clítoris
- Aumento de tamaño del pene
- Crecimiento de la próstata con dificultad para orinar
- Erecciones dolorosas
- Formación alterada de espermatozoides
- Crecimiento estatural incompleto
- Masculinización

Estos son todos efectos secundarios leves del DECANOATO DE NANDROLONA. Cuénteles a su médico si nota cualquier cambio de la voz o retención de líquidos o si los efectos secundarios son graves y molestos.

Si observa cualquier efecto secundario no mencionado en este folleto, por favor informe a su médico o químico farmacéutico.

#### **5. ALMACENAMIENTO.**

Mantener fuera del alcance y vista de los niños.

No almacenar por sobre los 30°C. No refrigerar o congelar. Mantener el envase en el estuche de manera de protegerlo de la luz.

No utilice el producto después de la fecha de vencimiento.