

Nombre: Neostigmina bromuro Condición de venta: con receta médica Clasificación: antimiasténico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento sintomático de la **miastenia gravis**.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 150 mg. al día, los intervalos de las dosis varían con cada persona y deben ser indicadas por su médico.

La dosis pediátrica recomendada para el tratamiento de la miastenia gravis es de 2 mg./Kg./día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento junto con los alimentos o con leche para reducir la irritación estomacal.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Embarazo

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el **feto**, puede ocurrir una debilidad muscular temporal en los recién nacidos. Debe conversar con su médico sobre la conveniencia de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

- Lactancia

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a neostigmina bromuro.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento si padece de asma o si tiene algún bloqueo en sus intestinos o en el tracto urinario.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: guanadrel, guanetidina, procainamida, maltion.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de infección urinaria, trastorno del ritmo cardíaco, asma, convulsiones, tiroides hiperactiva.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: inflamación de la lengua, labios y garganta, rash, hinchazón, dificultad para respirar, convulsiones, espasmos o debilidad en sus músculos, movimientos musculares involuntarios que no puede controlar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea, salivación, náuseas, dolor estomacal, aumento en la frecuencia para orinar, aumento en las secreciones bronquiales.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: visión borrosa, confusión, convulsiones, diarrea severa, aumento en las secreciones bronquiales o salivación excesiva, mayor debilidad muscular, calambres musculares,, náuseas o vómitos severos, dificultad para respirar, zumbido del pecho, dificultad para hablar, calambres estomacales, irritabilidad, nerviosismo, mareos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.