

Nombre: Nimesulida

Condición de venta: con receta médica

Clasificación: Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio

Disponible en:

Nombres de marca:

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento a corto plazo de estados inflamatorios y dolorosos.

2.- Administración

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 50 a 100 mg dos veces al día. No se debe administrar una dosis superior a 100 mg dos veces al día.

Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome el medicamento después de las comidas .

- Uso prolongado

En el caso de tratamientos prolongados se debe realizar bajo un control médico periódico. No se debe administrar por más de 7 días sin control médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con nimesulida. Se debe evitar el uso prolongado en estos pacientes.

- Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento, ya que se puede ver aumentado el riesgo de efectos adversos .

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

No se debe administrar a niños menores de 12 años.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Este medicamento puede causar, con una incidencia muy baja, daño hepático severo, incluyendo casos fatales, pacientes que presenten síntomas compatibles con daño hepático como pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura o pacientes que tengan alteradas las pruebas de función hepática deben discontinuar el tratamiento con nimesulida y no deben ser nuevamente expuestos al medicamento. El daño hepático, reversible en la mayoría de los casos, ha sido reportado luego de una corta exposición a la droga.

Nimesulida puede provocar mayor sensibilidad al sol, incluso quemaduras y otras reacciones a la piel, consulte con su médico en caso de ocurrir esto.

No de usar otros analgésicos mientras esté en tratamiento con nimesulida.

Usted debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca) Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

Este medicamento no debe administrarse en adolescentes cuando desarrollen síntomas de infección viral, debido a que puede provocar síndrome de Reye.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a nimesulida, ácido acetilsalicílico (aspirina) u otros antiinflamatorios.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si ha presentado reacciones alérgicas; como dificultad respiratoria, luego de la administración de antiinflamatorios.

En caso de que sufra de daño hepático o tenga antecedentes de reacciones hepatotóxicas frente a una exposición previa con nimesulida.

En caso de tener menos de 12 años.

No debe usar este medicamento en el periodo inmediato a un by pass coronario.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: ácido acetilsalicílico (aspirina), acenocumarol, warfarina, colestiramina, metotrexato, probenecid, sales de litio, ciclosporina, digoxina, fenitoína, ácido valproico, ciprofloxacino, ofloxacino, ketoconazol, prednisona, dexametasona.

- Enfermedades

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Ud. debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los siguientes casos:

Enfermedades virales, especialmente en niños (por ejemplo síntomas de resfrío o gripe), alcoholismo, problemas de coagulación, enfermedades del sistema digestivo, úlceras digestivas, diabetes mellitus, enfermedades hepáticas o renales, enfermedades respiratorias o nasales de cualquier tipo, lupus eritematoso sistémico, anemia, epilepsia, retención de líquido (hinchazón de pies o pantorrillas), enfermedades cardíacas, presión alta, bajo recuento plaquetario o de glóbulos blancos, porfiria, arteritis temporal, úlceras, lesiones o manchas blancas en la boca, inflamación de las encías antes o después de intervenciones quirúrgicas (incluyendo los procedimientos dentales).

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **reacciones alérgicas**, retención de líquidos, **úlceras** de estómago, dolor de cabeza, mareos, **hemorragia** digestiva, orina oscura, dolor abdominal intenso .

Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **anorexia**, **fatiga**, **urticaria**, molestias en el estómago, náuseas y vómitos.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, dolor de cabeza severo, confusión y mal estar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.