

<b>Nombre:</b> Nandrolona <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> anabólico <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de procesos catabólicos o agotadores de tejido, anemia y carcinoma de mamas.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de 50 a 100 mg. por semana en el caso de la mujeres y de 100 a 200 mg. Por semana en el caso de los hombres

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda consumir una dieta rica en proteínas y alta en calorías, para que el medicamento actúe óptimamente.

#### - Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

Se recomienda que visite regularmente a su médico para que evalúe su tratamiento y así evitar que se presenten efectos secundarios no deseados.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos se puede ver incrementado el riesgo de desarrollar **hipertrofia prostática** o cáncer de próstata, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con nandrolona.

#### - Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, utilice un efectivo método anticonceptivo, si piensa que ha quedado embarazada, infórmeselo inmediatamente a su médico.

#### Lactancia

Se desconoce el efecto que puede causar este medicamento en el lactante . Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

#### - Lactantes y niños

Este medicamento puede retardar el crecimiento normal del niño o causar un desarrollo acelerado de su sexualidad, el pediatra debe evaluar el **riesgo/beneficio** de su administración.

#### - Precauciones especiales

- No debe dejar de tomar este medicamento sin la autorización de su médico, ya que se puede presentar un empeoramiento de los síntomas de su enfermedad.
- Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.
- Usted debe señalar a su médico si ha presentado alergia a alguna hormona, otro medicamento, alimento, colorante
- No use este medicamento para tratar cualquier condición que no haya sido diagnosticada por su médico. Los esteroides NO sirven para mejorar sus capacidades atléticas y, si usted los usa con este propósito, pueden causarle efectos secundarios graves en forma permanente.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a nandrolona.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: acetaminofeno (paracetamol), amiodarona, andrógenos, propiltiouracilo, carbamazepina, carmustina, cloroquina, dantroleno, daunorrubicina, disulfiram, divalproex, estrógenos, etretinato, sales de oro, hidroxiclороquina, mercaptopurina, matorexato, metildopa, naltrexona, anticonceptivos orales, clorpromazina, flufenazina, promazina, tioridazina, fenitoina, plicampicina, ácido valproico, warfarina, acenocumarol.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de cáncer de mamas, **diabetes mellitus**, **hipertrofia prostática**, cáncer de próstata, antecedentes de altas concentraciones de calcio en la sangre

##### - Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento, ya que se pueden ver alterados algunos exámenes como el de azúcar sanguínea.

#### 6.- Efectos adversos

**Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:** piel u ojos amarillos, heces oscuras orina oscura, manchas rojas en el cuerpo o dentro de la boca o nariz, úlceras en la garganta, fiebre, vómitos con sangre, dolor de huesos, náuseas o vómitos, úlceras en la lengua, debilidad en las piernas, hemorragias inusuales, ganancia de peso inusual, dolor abdominal, sensación de malestar, picazón, pérdida del apetito, inexplicable pérdida de peso, sólo en las mujeres se puede presentar acné, aumento del tamaño del clítoris, cambios en la voz,

periodos menstruales irregulares, crecimiento de vello, inusual pérdida del cabello, sólo en los hombres se puede presentar acné, aumento del tamaño del pene, aumento en la frecuencia de erecciones, aumento en la frecuencia para orinar.

#### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: escalofríos, diarrea, **sensación de plenitud**, calambres musculares, dificultad para dormir, inusual aumento o disminución del deseo sexual, acné.

#### 7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: manchas rojas en el cuerpo o dentro de la boca o nariz, úlceras en la garganta, fiebre, vómitos con sangre, dolor de huesos, náuseas o vómitos, úlceras en la lengua, debilidad en las piernas, hemorragias inusuales.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.