

Nombre: Nifurtimox Condición de venta: con receta médica Clasificación: antichagásico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento de la fase aguda y crónica del mal de chagas.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Niños de 17 años y adultos: La dosis usual recomendada para tratar el mal de chagas es de 8 a 10 mg./Kg./día en 4 dosis divididas por un período de 120 días
- Niños entre 11 y 16 años: La dosis recomendada es de 12.5 a 15 mg./Kg./día divididos en 3 o 4 dosis iguales, el tratamiento dura entre 90 y 120 días.
- Para niños hasta 10 años: La dosis usual recomendada es de 15 a 20 mg./Kg./día divididas en 3 o 4 tomas diarias, la duración del tratamiento dura entre 90-120 días, dependiendo de la severidad de la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo junto con un vaso de agua.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

No abandone el tratamiento antes del tiempo indicado por su médico, esto puede significar que la infección vuelva a presentarse.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de nifurtimox.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe conversar con su médico, sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Durante el tratamiento se deben producir ajustes de la dosis, debido a la pérdida de peso que se puede producir, por lo que debe visitar periódicamente a su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a nifurtimox.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **epilepsia** o antecedentes de convulsiones, daño cerebral, **psicosis**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: pérdida de la memoria, convulsiones, excitación, psicosis, temblor, debilidad muscular.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: anorexia, alteraciones del sueño, náuseas y vómitos, dolor estomacal

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, dolor estomacal.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

