

Nombre: Nosacapina Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antitusivo Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1. - ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado para el alivio sintomático de tos no productiva debida a irritaciones leves de garganta y bronquios que aparecen con el resfrío y la inhalación de irritantes.

2. - Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Dosis adultos: 15 a 20 mg cada 4 horas.

Dosis niños: 5 mg cada 4 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

En el caso de los comprimidos, debe tomarlos con abundante líquido, cuando se trata de jarabes debe tomarlo con la cuchara de dosificación que adjunte el envase, de lo contrario lo más recomendable es que utilice una jeringa sin aguja (limpia, sin uso previo) para administrar la dosis exacta.

- Uso prolongado

Si la tos persiste después de 3 días de tratamiento, debe suspender el medicamento y consultar a su médico.

No debe usar este medicamento en forma prolongada o repetida sin consultar con su médico.

3. - Precauciones

- Mayores de 60 años

En pacientes ancianos se recomienda utilizar la mitad de la dosis según la indicación de su médico, y observar que no se presenten síntomas como cansancio extremo o dificultad para respirar, en estos caso se recomienda que deje de tomar el medicamento.

- Consumo de alcohol

No debe consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que se intensifican los efectos adversos de noscapina.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas **somnolencia**, mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que

ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- **Precauciones especiales**

Este medicamento sólo alivia la tos asociada a irritaciones leves de garganta, debe consultar con su médico si observa aparición de flemas, fiebre por más de dos días, cansancio o dificultad para respirar, sudoración nocturna o cualquier otro síntoma distinto o exagerado respecto a un resfrío común.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntoma más de alergia a nospapina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

En el caso que padezca de tos asmática o insuficiencia respiratoria (caracterizada por cansancio extremo o inusual).

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente diazepam, alprazolam, fenobarbital, morfina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **glaucoma**, **asma**, retención urinaria o cualquier enfermedad relacionada con el sistema respiratorio.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **broncoconstricción**, **hipotensión** transitoria, **constipación**.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: ligera **somnolencia**, mareos, dolores de cabeza, náuseas.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: dificultad respiratoria, mareos, náuseas, **desvanecimientos**. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

