

Nombre: Oxolamina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antiinflamatorio respiratorio Disponible en:	Nombres de marca:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento sintomático de la tos cuando existe inflamación e irritación de las vías respiratorias.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Adultos y niños mayores de 12 años: 50 a 100 mg. Cada 4 horas.
- Niños de 2 a 12 años: 28 a 84 mg. Cada 4 horas.
- Menores de 2 años: 14 mg. Cada 4 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe administrarlo utilizando el dosificador incluido en el envase, en caso de no tener dosificador puede utilizar una jeringa sin uso y sin aguja, para administrar los mL indicados por su médico en forma exacta.

Luego de tomar el medicamento puede beber un vaso de agua.

- Uso prolongado

No debe utilizar el medicamento por más de 8 días, si los síntomas persisten o empeoran, consulte nuevamente con su médico.

3.- Precauciones

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- **Lactantes y niños**

No debe administrarlo a niños menores de 3 meses, a menos que su pediatra lo señale.

- **Precauciones especiales**

No debe utilizar este medicamento en caso de presentar tos con producción de secreciones (flemas).

Si su médico lo indica, este medicamento puede utilizarse en conjunto con antibióticos, para mejorar el tratamiento **antiinfeccioso**.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: warfarina, acenocumarol.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento si padece problemas de **coagulación** sanguínea.

6.- Efectos adversos

Pueden presentarse algunos efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: somnolencia, sensación de fatiga muscular, sedación, alucinaciones, agitación, sequedad de boca, palpitaciones.

7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.