

Nombre: Panax Ging Seng Condición de venta: sin receta médica Clasificación: psicoenergético Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado como estimulante y tónico en casos de cansancio físico y mental.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

500 mg a 2 gramos de raíz seca y 200 a 600 mg de extracto sólido.

- Consejo de cómo administrarlo

Se debe tomar con un vaso de agua.

- Uso prolongado

No debe tomar este medicamento por periodos prolongados de tiempo, ya que se pueden presentar efectos adversos severos.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Las personas mayores de 60 años son más sensibles a los efectos adversos de este medicamento.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento atraviesa la placenta y puede afectar al feto, no debe utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, no debe utilizar este medicamento si se encuentra amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. No se recomienda su uso en niños menores de 12 años.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al ging seng.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **hipertensión**, nerviosismo, irritabilidad e insomnio.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas y vómitos leves.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, irritabilidad, hipertensión.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

