

Nombre: Paracetamol - Pseudoefedrina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antigripal Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el tratamiento de los síntomas de la gripe y el resfrío común.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Usted debe usarlo en la dosis y frecuencia recomendada por su médico, no obstante la dosis general recomendada es de 500 mg. de paracetamol con 30 mg. de pseudoefedrina 2 a 3 veces al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se aconseja tomarlo junto con las comidas y con un vaso de agua.

- Uso prolongado

No tome más de 5 días, si los síntomas persisten o empeoran debe consultar al médico. En caso de fiebre no usar mas de tres días, en caso de dolor de garganta no mas de dos días sin control médico, puede tener alguna complicación y necesitar otro medicamento.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

- Consumo de alcohol

Debe evitar consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que este puede provocar un aumento de los efectos adversos del medicamento.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de usar este medicamento.

- **Lactantes y niños**

Estos pacientes son más sensibles a los efectos adversos del medicamento, la administración debe ser previa consulta al pediatra.

- **Precauciones especiales**

Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si es alérgico a algún medicamento, alimento, saborizante y / o edulcorante, o colorante.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico. Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a paracetamol y /o pseudoefedrina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: analgésicos, antihistamínicos, antitusivos, vitaminas y en general si se encuentra en tratamiento con cualquier otro medicamento, ya que el consumo de este antigripal puede alterar el efecto de otros medicamentos y causarle daño a su salud.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **hipertensión**, antecedentes de abuso de alcohol, **anemia**, **gota**, enfermedades cerebrales, colitis, convulsiones, diarrea, **fibrosis quística**, **diabetes mellitus**, **enfisema pulmonar**, **asma**, o alguna enfermedad pulmonar crónica, **hipertrofia prostática**, dificultad para orinar, **glaucoma**, **hipertensión**, alguna enfermedad a la **tiroides**.

- **Exámenes de laboratorio**

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: diarrea, pérdida del apetito, náusea o vómitos, calambres o dolor estomacal, **rash**, picazón o escalofríos, dolor de garganta y fiebre que no se habían presentado antes, mareos, ojos y piel de color amarillo, convulsiones, sequedad de boca, nariz o garganta, enrojecimiento de la cara, **alucinaciones**, dificultad para respirar, dolor de cabeza, aumento de los latidos del corazón, cambios en el ritmo de los latidos del corazón.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al

medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: constipación, dificultad o dolor para orinar, mareos leves, sequedad de boca, nariz o garganta, aumento de la sensibilidad de la piel al sol, náuseas o vómitos, dolor estomacal, nerviosismo, palidez, irritabilidad.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: calambres o dolor estomacal, diarrea, convulsiones, etc.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona