

Nombre: Peróxido de benzoilo Condición de venta: sin receta médica de uso tópico hasta una potencia de 5% Clasificación: antiacnéico Disponible en:	Nombres de marca:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el tratamiento del acné vulgaris.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

La dosificación de este medicamento depende de la concentración de peróxido de benzoilo que contenga, de la forma farmacéutica y de la indicación del medicamento; por lo que debe seguir las instrucciones del envase o de su médico si este se lo recetó.

Para el tratamiento del acné habitualmente se utilizan concentraciones desde 0,5% a 5% y se aplica de 1 a 3 veces al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe lavar y secar la zona afectada antes de aplicar el medicamento.

Debe lavarse las manos antes de aplicar este medicamento en la zona afectada.

- Uso prolongado

Si los síntomas persisten luego de 4 a 6 semanas de tratamiento debe consultar con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, pero se desconoce si pasa a la leche materna. Sin embargo, no se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños menores de 12 años debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

No debe aplicar este medicamento en los ojos o en otras zonas mucosas, tales como la boca, los labios, dentro de la nariz o en áreas sensibles del cuello.

Si el medicamento le causa enrojecimiento, descamación o sequedad de esta zona debe consultar con su médico, ya que puede ser necesario que disminuya la dosis o la cantidad de aplicaciones del medicamento al día.

No debe utilizar otras preparaciones para el acné sobre la zona en que utiliza peróxido de benzoilo a menos que su médico así lo indique.

Usted debe consultar al médico antes de usar este medicamento si ha presentado alergia a otras sustancias como **preservantes** o colorantes

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a peróxido de benzoilo.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dolor e irritación de la piel, quemazón, rash, palidez severa, reacciones de **hipersensibilidad** (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sequedad o descamación de la piel, picazón, irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: quemazón, palidez severa, picazón de la piel.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.