

PARACETAMOL -FENILEFRINA CLORHIDRATO-FENIRAMINA MALEATO POLVO PARA SOLUCION ORAL EN SOBRES

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición:

Cada sobre contiene los siguientes ingredientes activos:

paracetamol: 325mg

fenilefrina clorhidrato: 10mg

feniramina maleato.:20mg

También contiene ingredientes inactivos: Según lo aprobado en Registro

Cada sobre contiene X mg de sodio. (Según lo aprobado en Registro)

¿para que se usa este medicamento?

Este medicamento se usa para el alivio de los síntomas del resfriado y de la gripe

¿Qué es este Medicamento polvo para solución oral en sobres?

Este Medicamento contiene una combinación de antipirético y analgésico (acetaminofeno), un antihistamínico que ayuda a parar la rinorrea (feniramina maleato) y un descongestionante (Fenilefrina clorhidrato) para reducir la hinchazón de las membranas mucosas.

Los ingredientes activos, actúan juntos para reducir temporalmente los principales síntomas asociados con el resfriado y la gripe, entre ellos:

- fiebre y escalofríos
- dolor e incomodidad corporal
- dolor de cabeza
- congestión nasal
- estornudos y rinorrea.

¿Qué hay que comprobar antes de tomar este Medicamento polvo para solución oral en sobres?

No ingiera este medicamento, si:

- Es alérgico a cualquiera de los ingredientes que se indican anteriormente;
- Ha tomado en las últimas dos semanas un medicamento con receta que contenga un inhibidor de la monoaminoxidasa (IMAO), (entre los fármacos IMAO se incluyen medicamentos para el tratamiento de la depresión, los trastornos psiquiátricos o emocionales y la enfermedad de Parkinson. Si no está seguro si el medicamento con receta que toma es un IMAO, consulte con un profesional de la salud);
- Está utilizando otros productos que contienen paracetamol.
- Tiene una enfermedad pulmonar (incluyendo al asma);
- Tiene una deficiencia de glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G-6FD).

Con otras enfermedades:

Si tiene los siguientes problemas médicos, consulte con su médico antes de tomar este producto:

- enfermedad cardíaca, hipertensión, enfermedad de la tiroides, diabetes o glaucoma (aumento de la presión dentro del ojo);

- enfermedad renal;
- enfermedad hepática;
- epilepsia;
- dificultad urinaria.

Otros puntos que deben tener en cuenta:

- No tome más dosis ni durante más tiempo, de lo indicado.
- Este medicamento contiene paracetamol, sustancia que, ingerida en dosis superiores a las recomendadas o durante largos periodos de tiempo, puede provocar severo daño en el hígado.
- El descongestionante (fenilefrina) del puede provocar un falso positivo en las pruebas de detección de sustancias que aumentan el rendimiento atlético.
- No administrar a niños menores de 12 años

Embarazo y lactancia:

Como con cualquier otro medicamento, si existe la posibilidad de que este embarazada o si está dando el pecho pida consejo a su médico o farmacéutico antes de utilizar este producto.

Tratamiento con otros medicamentos:

Por favor, consulte con su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los que no necesitan receta médica.

Conducción y manejo de máquinas:

Este medicamento puede provocar somnolencia.

No conduzca vehículos motorizados ni maneje maquinaria pesada mientras tome este producto.

Aviso sobre el alcohol:

Debe evitar beber alcohol mientras tome este medicamento ya que, combinado con la ingesta de alcohol, el paracetamol puede causar lesiones en el hígado.

¿Cómo se debe tomar este medicamento?

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos y niños mayores del 12 años: disolver el contenido de un sobre en aproximadamente 200 ml de agua hirviendo. Se puede tomar cada 4 a 6 horas según se necesite, pero no se deben tomar más de 3 dosis en 24 horas.

Deje de tomarlo y consulte a su médico si :

- la fiebre persiste por más de 3 días;
- los síntomas de dolor no mejoran después de 5 días ;
- la tos persiste durante mas de 5 días, vuelve o se acompaña de fiebre, erupción cutánea o dolor de cabeza persistente;
- la irritación de garganta persiste durante mas de 2 días y/o se acompaña de fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náuseas o vómitos.

Estos síntomas podrían ser señal de un trastorno grave.

¿Qué debería hacer si se le olvida una dosis?

Este producto se debe tomar cada cuatro o seis horas mientras persistan los síntomas durante no mis de cinco días consecutivos. Si se le olvida de tomar una dosis, tómela en cuanto se dé cuenta y, si es necesario, vuelva a tomar otra dosis después de 4 horas.

¿Qué debería hacer si toma demasiado medicamento?

En caso de sobredosis, póngase inmediatamente en contacto con su médico o farmacéutico o centro de control toxicológico, incluso si no tiene síntomas.

¿Qué efectos secundarios puede provocar este medicamento?

Los efectos secundarios más comunes son reacciones cutáneas alérgicas leves, somnolencia, náuseas, mareos, sequedad en la boca o garganta, cansancio, dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad y nerviosismo, taquicardia (aceleración de los latidos del corazón) y palpitaciones.

También pueden ocurrir trastornos gastrointestinales, entre los que se incluyen: estreñimiento, diarrea o hinchazón, y ocasionalmente pueden ocurrir inquietud y trastornos del sueño.

Si observa usted cualquier efecto secundario que no se mencione en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el envase. La fecha viene mareada como, <EXP> en el envase.

Presentación:

Según lo aprobado en Registro

¿Cómo se debe conservar este medicamento?

Según lo aprobado en Registro

Como todos los medicamentos, se debe mantener fuera del alcance de los niños.

REVISADO EL 18 DE ENERO DEL 2007