

Nombre: Permetrina Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: pediculicida Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado en el tratamiento de la infestación con pediculus humanus, variedad capitis (piojo de cabeza) y sus huevos (liendres) en adultos y niños mayores de 2 años.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

Para el tratamiento de pediculosis: sólo una aplicación.

- Consejo de cómo administrarlo

Para el tratamiento de la pediculosis debe aplicar después de lavar el cabello, sobre el cuero cabelludo asegurándose de aplicar por detrás de las orejas y en el cuello; debe mantener el medicamento 10 minutos, luego debe enjuagar el cabello (sin aplicar shampoo) y peinar con un peine fino todos los días.

- Uso prolongado

No lo use por más tiempo o mas frecuentemente que lo recomendado, el uso muy frecuente puede provocar efectos adversos serios.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

- Lactancia

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. No se recomienda su uso en niños menores de 2 años.

- Precauciones especiales

Si después de 7 días, sus síntomas no mejoran o empeoran (se observan piojos y liendres) puede aplicar nuevamente el medicamento. Si a pesar de esto se vuelve a presentar la infección debe acudir al médico.

Debe evitar aplicar este medicamento en la boca o tragarlo.

No debe aplicar este medicamento en los ojos u otras membranas como dentro de la nariz, ya que permetrina puede causar irritación. Si esto sucede debe lavar con abundante agua.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a permetrina o decametrina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

- Enfermedades

Usted debe consultar con farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si padece de alguna inflamación severa de la piel.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: irritación de la piel, rash, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos.

Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.