

Nombre: Pirazinamida Condición de venta: con receta médica Clasificación: antituberculoso Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento de tuberculosis en combinación con otros medicamentos.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 25-30 mg./Kg./día. La dosis máxima diaria es de 3g./día.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar este medicamento junto con las comidas para evitar la irritación estomacal.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. Si los síntomas no disminuyen luego de 2 a 3 semanas debe consultar con su médico.

No suspenda el medicamento sin que su médico se lo haya indicado, aunque sienta que los síntomas de su enfermedad han desaparecido, esto podría tener como consecuencia que la infección se agrave nuevamente

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con pirazinamida.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de pirazinamida.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

No se han reportado efectos sobre el feto, no obstante debe conversar con su médico sobre la conveniencia de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

- Lactancia

Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños honesta recomendado, debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Si después de 2 a 3 semanas de tratamiento, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Si tiene gota, diabetes o alguna enfermedad al hígado hable con su médico antes de iniciar el tratamiento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a pirazinamida, isonizida o niacina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al **hígado**, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **gota**, **diabetes mellitus**, antecedentes de abuso de alcohol.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: salpullidos, dolor en las articulaciones, pérdida del apetito, inflamación de las articulaciones, la piel sobre las articulaciones se puede presentar tensa y afiebrada, mareos, ojos y piel amarillos, orina oscura.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: picazón y **rash** leve.

7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C. La una vez reconstituída la suspensión debe mantenerse refrigerada a menos de 5° C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.