

Nombre: Praziquantel Condición de venta: con receta médica Clasificación: antihelmíntico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento de infecciones **gastrointestinales** causadas por **helmintos como la esquistosomiasis y la clonorquiasis**. Los helmintos son parásitos invertebrados capaces de causar una gran variedad de enfermedades al ser humano .

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- ❖ Esquistosomiasis: 60 mg. /Kg. /día en 3 dosis divididas por una día. El intervalo entre una dosis y otra no debe ser menor de 4 horas ni mayor de 6 horas.
- ❖ Clonorquiasis y opistoriasis: 75 mg. /Kg. / día en 3 dosis divididas por una día. El intervalo entre una dosis y otra no debe ser menor de 4 horas ni mayor de 6 horas.
- ❖ Teniasis: Una dosis única de 5 a 10 mg. /Kg.
- ❖ Neurocisticercosis: 3 dosis de 25 mg. /Kg. De peso en intervalos de 2 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo junto con líquido o con los alimentos.

Se aconseja administrar el medicamento a toda la familia, ya que aunque no se presenten síntomas pueden encontrarse contagiados.

- Uso prolongado

Debe usarlo por todo el periodo que su médico le señale

3.- Precauciones

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada o desea estarlo.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Si después de completar el tratamiento sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar, nuevamente, con su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: prednisona, betametsona, cimetidina, ketoconazol, miconazol.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de algún tipo de disfunción hepática.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: náusea, vómitos, diarreas, mareos.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: falta de apetito, calambres estomacales, dolor de cabeza, somnolencia, náuseas, diarrea.

7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

