

Nombre: Propanolol Condición de venta: con receta médica Clasificación: bloqueador beta adrenérgico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada, angina de pecho, arritmias cardíacas e infarto agudo de miocardio .

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Hipertensión: 40 mg. 2 veces al día, esta dosis puede ser aumentada gradualmente según recomendación médica.

Tratamiento de arritmias: 20-40 mg. 2 veces al día la que se puede aumentar hasta los 16 mg. diarios.

Angina: 80 a 160 mg. diarios según prescripción médica.

- Consejo de cómo administrarlo

Lo puede tomar con agua , jugos o bebidas gaseosas.

Aunque su presión arterial se encuentre controlada y se sienta bien, no debe dejar de tomar el medicamento hasta que su médico lo indique.

Utilice este medicamento en la dosis y frecuencia prescrita por su médico.

- Uso prolongado

Este medicamento es usado durante periodos prolongados, pero debe usarlo bajo supervisión médica acudiendo a control en forma periódica.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con propanolol.

- Consumo de alcohol

Usted debe evitar el consumo de alcohol, mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que se aumenta el riesgo de efectos adversos del alcohol y del medicamento.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento en el caso de estar embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

Este medicamento puede ser utilizado en niños sólo bajo estricta supervisión de su pediatra.

- Precauciones especiales

Propranolol puede hacerle más sensible al frío, especialmente si tiene problemas circulatorios.

Este medicamento puede enmascarar los síntomas de hipoglicemia, hable con su médico si usted padece de diabetes.

El propranolol es una sustancia prohibida en el deporte de competición y puede dar positivo en un control de **dopaje**.

Si usted padece de enfermedad coronaria, deben ir reduciendo la dosis poco a poco antes de interrumpir el tratamiento, su médico le indicará la forma de reducir la dosis..

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado **bloqueo cardíaco**, **bradicardia** intensa o **shock cardiogénico**.

Si ha presentado síntomas de alergia a este u otro medicamento **betabloqueador**.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si usted presenta asma, presión arterial baja consúlte a su médico antes de iniciar la terapia con este medicamento.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: ácido ascórbico (vitamina C), antiácidos, glibenclamida, ácido acetilsalicílico (aspirina) y otros antiinflamatorios, alprazolam, fenobarbital, cimetidina, ergotamina, dipiridamol, fluoxetina, haloperidol, heparina, salbutamol, teofilina, insulina, clonidina.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **acidosis metabólica**, **asma** u otras enfermedades **broncoespásticas**, **cardiopatía isquémica**, depresión, **diabetes** (propranolol puede enmascarar síntomas de baja de glucosa), **enfermedad de Raynaud**, **feocromocitoma**, **hipertiroidismo**, **insuficiencia cardíaca**, **miastenia gravis**, **soriasis**.

- Exámenes de laboratorio

Se pueden ver afectados diversos resultados de exámenes sanguíneos y pruebas de diagnóstico, por lo que se debe informar que se está utilizando este medicamento antes de realizarse algún examen.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: depresión, dificultad para respirar, disminución de los latidos cardíacos, dolor en el pecho, hinchazón de tobillos, pies o piernas

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **fatiga**, mareos, dolor de cabeza, **insomnio**.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: dificultad para respirar, disminución de los latidos cardíacos, presión arterial muy baja. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.