

Nombre: Clorfenamina – Codeína- Pseudoefedrina

Condición de venta: con receta médica

Clasificación: Antihistamínico – descongestionante - antitusivo

Disponible en: Jarabe

Nombres de marca:

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

§ **Composición y presentación:**

§ **Principio Activo:**

§ **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado en el tratamiento de la tos de diversa etiología, especialmente la asociada a procesos respiratorios y bronquiales del adulto y niños mayores de 12 años y en la tos asociada a estados gripales y resfrios.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: Adultos y niños mayores de 12 años y adultos: 5 a 10 mL de jarabe por vía oral, cada 4 a 6 horas. No se debe sobrepasar la dosis recomendada

- Uso prolongado

No tome más de 7 días, si los síntomas persisten o empeoran debe consultar al médico, nuevamente, puede tener alguna complicación y necesitar otro medicamento.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos

- Consumo de alcohol

Debe evitar consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que este puede provocar un aumento de los efectos adversos del medicamento.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe avisar a su médico, que está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento

- Lactantes y niños

Estos pacientes son más sensibles a los efectos adversos del medicamento, la administración debe ser previa consulta al pediatra. No se recomienda su uso en niños menores de 6 años.

- Precauciones especiales

Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si es alérgico a algún medicamento, alimento, saborizante y / o edulcorante, o colorante. Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico. Informe a su médico si usted tiene asma, enfisema, apnea del sueño o cualquier enfermedad pulmonar.

Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Sólo debe utilizar este medicamento si dentro de los síntomas de resfriado presenta tos no productiva (sin flema), ya que si no tiene tos o la tos es acompañada de flemas debe utilizar un medicamento diferente a este; consulte con su farmacéutico.

Este medicamento puede causar sequedad de boca, la cual puede aliviarse chupando caramelos.

Antes de hacerse un examen de alergia a la piel debe avisarle al profesional de la salud a cargo que usted está tomando este medicamento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a clorfenamina, codeína y /o pseudoefedrina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta.

En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: atropina, antidiabéticos, otros analgésicos, antihistamínicos, antitusivos, ácido ascórbico (vitamina C) y en general si se encuentra

en tratamiento con cualquier otro medicamento, ya que el consumo de este antigripal puede alterar el efecto de otros medicamentos y causarle daño a su salud.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **hipertensión**, antecedentes de abuso de alcohol, **anemia**, **gota**, enfermedades cerebrales, colitis, convulsiones, diarrea, **fibrosis quística**, **diabetes mellitus**, **enfisema pulmonar**, **asma**, o alguna enfermedad pulmonar crónica, **hipertrofia prostática**, dificultad para orinar, **glaucoma**, alguna enfermedad a la **tiroides**.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: diarrea, pérdida del apetito, náusea o vómitos, calambres o dolor estomacal, **rash**, picazón o escalofríos, dolor de garganta y fiebre que no se habían presentado antes, mareos, ojos y piel de color amarillo, convulsiones, sequedad de boca, nariz o garganta, enrojecimiento de la cara, **alucinaciones**, dificultad para respirar, dolor de cabeza, aumento de los latidos del corazón, cambios en el ritmo de los latidos del corazón, frío, somnolencia, pupilas pequeñas.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: constipación, dificultad o dolor para orinar, mareos leves, sequedad de boca, nariz o garganta, aumento de la sensibilidad de la piel al sol, náuseas o vómitos, dolor estomacal, nerviosismo, palidez, irritabilidad.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: calambres o dolor estomacal, diarrea, convulsiones, confusión, somnolencia, inconciencia, frío, pupilas pequeñas, mareos, dificultad para respirar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a la temperatura señalada en el envase

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.