

<b>Nombre:</b> Ranitidina <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antiulceroso <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado en:

- ❖ El tratamiento de ulcera duodenal activa y terapia de mantención para disminuir recurrencia de ésta.
- ❖ Tratamiento de ulcera gástrica benigna activa y terapia de mantención para disminuir recurrencia de ésta.
- ❖ Esofagitis de reflujo asociado a hipersecreción gástrica (síndrome de Zollinger-Ellison).

### 2.- Administración (oral, inyectable)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 150 mg. 2 veces al día durante 4 a 8 semanas.

*Dosis de mantención:* 150 mg. al acostarse, por un período que variará según el caso clínico (alrededor de 8 meses).

*Síndrome de Zollinger-Ellison:* 150 mg. 3 veces al día.

Se puede aumentar la dosis hasta 6 comprimidos al día, por períodos prolongados.

#### Consejo de cómo administrarlo

Se deben tomar preferentemente con las comidas o al acostarse, evitando alimentos que causen irritación.

#### - Uso prolongado

Debe tomar este medicamento bajo control médico.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Las reacciones adversas pueden ser más comunes y más severas en pacientes ancianos.

#### - Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol, ya que este puede aumentar las molestias estomacales.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que

ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe señalar al médico, que está embarazada o puede estarlo, antes de usar este medicamento.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa a través de la leche materna, puede producir acidez estomacal o excitación en los lactante, por lo que no debe utilizarlo durante la lactancia.

- **Lactantes y niños**

No es recomendable utilizar en niños. Su pediatra debe evaluar el **riesgo / beneficio** de su administración.

- **Precauciones especiales**

El tabaco de los cigarrillos disminuye la actividad de la ranitidina, por ello es preferible que no fume cuando este tomando el medicamento.

**4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a la ranitidina o a cimetidina, famotidina, nizatidina y roxatidina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

**5.- Interacciones**

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: antiácidos, fluoxetina, ácido acetilsalicílico, propanolol, cafeína, diazepam, glipizida, ketoconazol, lidocaína, fenitoína, procainamida, teofilina o warfarina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de alguna alteración renal o **inmunológica**.

- **Alimentos**

No debe consumir bebidas carbonatadas (gaseosas), frutas y jugos ácidos, bebidas que contengan cafeína y otras comidas y jugos ácidos que puedan irritar el estómago o interferir con la acción terapéutica de ranitidina.

**6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: palpitaciones, disminución en el ritmo del corazón, **hemorragias** inusuales, fiebre, escalofríos, aparición de infecciones.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor de cabeza, **fatiga**, mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, **constipación**, visión borrosa, disminución en el deseo o función sexual, temporal pérdida de cabello, **insomnio**, enrojecimiento de la piel, palidez.

**7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: vómitos, diarrea, problemas respiratorios, dificultad para hablar, **taquicardia**, **delirio**. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8. -Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.