

Nombre: Rifampicina Condición de venta: con receta médica Clasificación: Antiinfeccioso - antituberculoso Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento se utiliza para el tratamiento de tuberculosis pulmonar y para el tratamiento de la lepra.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

❖ Tuberculosis:

- Adultos: 10 mg/Kg. En una dosis diaria. Máximo 600 mg. al día.
- Niños mayores de 5 años: 10-20 mg./Kg. De peso no excediendo una dosis de 600 mg./día.

❖ Lepra:

- 600 mg./día por un período de 2-4 semanas.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Este medicamento debe tomarse con el estómago vacío, 1 hora antes de las comidas o 2 horas después de ellas. Es importante tomarlo en un horario regular.

Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, aunque sienta que los síntomas de su enfermedad han desaparecido, respetando los horarios y las dosis. Si los síntomas no mejoran luego de 2 a 3 semanas debe consultar con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de rifampicina.

- **Manejo de vehículos**

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

- **Embarazo**

Si usted tiene tuberculosis, debe ser tratado con medicamentos. Debe asegurarse que su médico sabe que se encuentra embarazada o puede estarlo. Este medicamento puede causar daño al **feto**.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna, sin embargo, no se ha reportado que su uso durante la lactancia cause daño en el niño. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. Su uso no está recomendado en niños menores de 5 años.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Los anticonceptivos orales pueden disminuir su efecto durante el tratamiento con rifampicina, por lo que debe utilizar otro método anticonceptivo para evitar el embarazo.

Durante el tratamiento con rifampicina puede observar una coloración rojo anaranjada o rojo - café de la orina, heces, saliva, sudor y / o lagrimas.

Este medicamento presenta interacciones con muchos medicamentos, dígame a su médico todos los medicamentos que consume, puede que las dosis de ellos tengan que ser modificadas.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a rifampicina.

Si ha presentado síntomas de alergia a algún excipiente de la formulación.

Evite tomar este medicamento si usted tiene una enfermedad severa al hígado.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: acetaminofeno (paracetamol), amiodarona, nandrolona, propiltiouracilo, carbamazepina, carmustina, cloroquina, daunorrubicina, disulfiram, divalproex, etretinato, sales de oro, hidroxicloroquina, isoniazida, mercaptopurina, metotrexato, metildopa, naltrexona, clorpromazina, promazina, tioridazina, plicampicina, ácido valproico, warfarina, acenocumarol, prednisona, betametasona,, digoxina, disopiramida, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, metadona, mexietina, quinidina, teofilina, verapamilo, anticonceptivos orales, fenitoina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al **hígado**, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de antecedentes de abuso de alcohol.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: escalofríos, dificultad para respirar, mareos, fiebre, dolor de cabeza, picazón, dolor muscular, rash, disminución en la frecuencia para orinar, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, úlceras en la garganta, hemorragias o moretones inusuales, ojos y piel amarillos.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea, calambres estomacales, dolor en la boca o lengua.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: picazón, piel anaranjada, inflamación de los ojos y la cara, cambios mentales.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C. La una vez reconstituída la suspensión debe mantenerse refrigerada a menos de 5° C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.