

**Nombre:** Salbutamol inhalatorio

**Condición de venta:** con receta médica

**Clasificación:** broncodilatador

**Disponible en:**

**Nombres de marca:**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- Composición y presentación:

- Principio Activo:

- Excipientes:

**1.- ¿Para qué se usa?**

Salbutamol está indicado para el tratamiento y prevención del bronco espasmo en pacientes con obstrucción reversible de la vía aérea.

**2.- Administración (inhalatoria)**


- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es 100 a 200 µg. cada 4 - 6 horas .

- Consejo de cómo administrarlo

**Antes de utilizar este medicamento por primera vez, lea atentamente las instrucciones que se detallan. Pida a su médico que le muestre la técnica adecuada y practique en su presencia el uso del dispositivo inhalador.**

1. Retire la tapa protectora
2. Agite fuertemente el aerosol dosificador antes de cada aplicación.
3. Espire profundamente.
4. Tome el aerosol en la mano y coloque la boquilla en los labios.
5. Inhale lenta y profundamente. Al mismo tiempo presione con el dedo índice el recipiente hacia abajo, obteniendo de esta manera la pulverización. Contenga la respiración por algunos segundos, luego retire la boquilla de la boca y espire lentamente. Espere por lo menos dos minutos entre una inhalación y otra.
6. Coloque la tapa protectora.



-

- **Uso prolongado**

Si lo utiliza por mucho tiempo, puede provocar una disminución en la efectividad del medicamento.

**3. - Precauciones**

- **Mayores de 60 años**

Se recomienda utilizar las dosis más bajas que permitan un adecuado control de la enfermedad

- **Manejo de vehículos**

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

No se han reportado problemas para la utilización de salbutamol por vía inhalatoria durante el embarazo, sin embargo debe consultar con su médico sobre la conveniencia de utilizar este medicamento durante el embarazo.

- **Lactancia**

Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

No debe utilizar salbutamol en niños menores de 2 años, a menos que su pediatra lo indique. Puede inducir excitación e intranquilidad en niños entre 2 a 6 años.

- **Precauciones especiales**

Este medicamento es una sustancia prohibida en el deporte de competición y puede dar positivo un control de **dopaje**.

Si padece de diabetes debe tener en cuenta que salbutamol puede provocar un aumento de los niveles de azúcar en la sangre.

Es muy importante que usted visite regularmente a su médico mientras se encuentre en tratamiento con salbutamol.

Si los síntomas empeoran o continúan debe acudir nuevamente al médico.

Debe evitar aplicar sobre los ojos, ya que puede causar irritación.

**4. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a salbutamol.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

**5. - Interacciones**

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: propanolol, atenolol, algunos **diuréticos** como furosemida, metildopa, teofilina, anfetaminas, inhibidores del apetito, medicamentos para los resfríos, para las alergias.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **diabetes mellitus**, **hipertiroidismo**, **insuficiencia coronaria**, **hipertensión**.

**6. - Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse

debe acudir en forma inmediata al médico, éstos son: inflamación de la cara, labios o alrededor de los ojos, mareos severos, palidez, dificultad para respirar, latidos irregulares del corazón, **taquicardia**, convulsiones, calambres, **urticaria**, **colapso**, náusea y vómitos.

#### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: intranquilidad, mareos, problemas para dormir, palpitaciones, **taquicardia**, nerviosismo, dolor de cabeza, temblor muscular, calambres musculares, debilidad.

#### 7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **hipotensión** o **hipertensión**, **arritmias**, palpitaciones, nerviosismo, **fatiga**, malestar, **insomnio**, dolor de cabeza, sequedad de boca, náuseas, dolor en el pecho, **taquicardia**. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.