

Nombre: Salbutamol inyectable Condición de venta: con receta médica Clasificación: broncodilatador Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado en el manejo del ataque de asma y en los síntomas del parto prematuro no complicado.

2.- Administración (inyectable)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de 0.25 mg. por vía subcutánea o intramuscular, la cual se puede repetir en 15 minutos si los síntomas no desaparecen, este régimen puede ser repetido cada 4 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Este medicamento debe administrárselo una persona preparada para aplicar inyecciones.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con salbutamol.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y/o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Se acepta el uso de salbutamol por vía parenteral para el tratamiento de parto prematuro. En general no debe utilizarlo durante el embarazo, a menos que su médico lo indique.

- Lactancia

Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

No debe utilizar salbutamol en niños menores de 2 años, a menos que su pediatra lo indique. Puede inducir excitación e intranquilidad en niños entre 2 a 6 años.

- Precauciones especiales

Este medicamento es una sustancia prohibida en el deporte de competición y puede dar positivo un control de **dopaje**.

Si padece de diabetes debe tener en cuenta que salbutamol puede provocar un aumento de los niveles de azúcar en la sangre.

Es muy importante que usted visite regularmente a su médico mientras se encuentre en tratamiento con salbutamol.

Si los síntomas empeoran o continúan debe acudir nuevamente al médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a salbutamol.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: propranolol, atenolol, algunos **diuréticos** como furosemida, metildopa, teofilina, anfetaminas, inhibidores del apetito, medicamentos para los resfríos, para las alergias.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **diabetes mellitus**, **hipertiroidismo**, **insuficiencia coronaria**, **hipertensión**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: alergia, latidos irregulares del corazón, **taquicardia**, convulsiones, calambres, **urticaria**, **colapso**, náusea y vómitos.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: : intranquilidad, mareos, problemas para dormir, palpitaciones, **taquicardia**, nerviosismo, dolor de cabeza, temblor muscular, calambres musculares, debilidad.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **hipotensión** o **hipertensión**, **arritmias**, palpitaciones, nerviosismo, **fatiga**, malestar, **insomnio**, dolor de cabeza, sequedad de boca, náuseas, dolor en el pecho, **taquicardia**. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.