

Nombre: Sibutramina Condición de venta: con receta médica Clasificación: inhibidor del apetito Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para aquellos pacientes cuyo exceso de peso implica un riesgo para su salud(IMC sobre 30 para obesos normales y sobre 27 para aquellos con otras condiciones asociadas), en los cuales los métodos tradicionales no han sido efectivos.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es iniciar la terapia con 10 mg. una vez al día, la cual puede aumentarse después de 4 semanas a 15 mg. Si no se ha obtenido la respuesta deseada, dosis mayores a 15 mg. Diarios no son recomendadas.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar por la mañana junto con un vaso de agua.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

No tome más medicamento que el indicado por su médico aunque sienta que el medicamento no surte efecto.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, no se recomienda su uso durante el embarazo, por lo que usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada o desea estarlo.

- Lactancia

Se desconoce si sibutramina pasa a la leche materna, no se recomienda su uso durante la lactancia. Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. No se recomienda utilizar en niños menores de 16 años.

- Precauciones especiales

Para obtener un resultado adecuado del tratamiento se recomienda consumir una dieta baja en calorías y practicar ejercicios, si su médico lo permite.

Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Usted debe ir periódicamente al médico para evaluar su progreso.

No beba exceso de alcohol, mientras esté en tratamiento

La sibutramina puede aumentar su presión sanguínea y el pulso. Hable con su doctor antes de tomar esta medicina si padece de presión sanguínea alta. No tome esta medicina si usted tiene historia de enfermedad del corazón, insuficiencia cardíaca, irregularidad en el ritmo cardíaco o ataques.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a sibutramina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si está o ha tomado unos antidepresivos llamados inhibidores de la monoaminoxidasa en las últimas dos semanas, puede provocarle convulsiones, presión alta

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: isocarboxazida, procarbazina, fenelzina, selegilina, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, venlafaxina, sumatriptan, dihidroergotamina, dextrometorfano, meperidina, pentazocina, fentanil, sales de litio, triptófano, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, efedrina, ketoconazol, eritromicina, cimetidina.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **hipertensión**, **arritmias**, **anorexia nerviosa**, **insuficiencia cardíaca**, **glaucoma**, **hipotiroidismo**, antecedentes de ataques de **apoplejía**, **cálculos biliares**.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dolor de cabeza, **taquicardia**, sed, dolores articulares, **rinitis**, **rash**, **dismenorrea**, **convulsiones**, hemorragias o moretones inusuales.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sequedad de boca, **constipación**, **anorexia**, **insomnio**.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: aumento del ritmo cardíaco.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.