

Nombre: Sulpiride Condición de venta: con receta médica Clasificación: antidepresivo Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de la esquizofrenia, manejo del síndrome de tourette y desórdenes de ansiedad y vértigo.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Manejo de la esquizofrenia : 200-400 mg. dos veces al día, la cual según la respuesta del paciente puede ser aumentada a un máximo de 1.2 g. Diarios.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con sulpiride.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de sulpiride.

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada o desea estarlo.

- Lactancia

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño, sin embargo debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando. Este medicamento puede aumentar el flujo de leche materna.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe suspender el tratamiento bruscamente, aunque se sienta bien, su médico debe indicarle cuando terminar el tratamiento, el retiro del medicamento debe ser gradual.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

- Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.
- Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes contenidos en la formulación.
- Si padece de feocromocitoma.
- Si padece Parkinson.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: litio, tramadol, amitriptilina, pseudoefedrina, loratadina, clorfenamina, fenobarbital, diazepam, alprazolam, isocrboxazida, seliginina, antiácidos, sucralfato, propanolol, hidroxicina, captopril, nitrendipino, nifedipino.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **feocromocitoma**, **glaucoma**, **epilepsia**, convulsiones, **miastenia gravis**, **enfermedad de Parkinson**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: temblor, mareos, dolor de cabeza, debilidad muscular, aumento del tamaño de los pechos, secreción de leche por los pechos, **erupción** cutánea.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: somnolencia, sequedad de boca, aumento de peso.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: temblor, mareos, dolor de cabeza, debilidad muscular, aumento del tamaño de los pechos, secreción de leche por los pechos, **erupción** cutánea.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.