

Nombre: Teofilina Condición de venta: con receta médica Clasificación: broncodilatador Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado para el alivio y/o prevención de síntomas de asma y broncoespasmos reversibles asociados con bronquitis crónica y enfisema en adultos y niños mayores de 12 años.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Al inicio de la terapia 10 mg/ kg/ día con una dosis máxima diaria de 300 mg. Luego la dosis se debe aumentar a 13 mg/ kg/ día según respuesta y tolerancia del paciente con una dosis máxima diaria de 450 mg. Al día, posteriormente se realiza un segundo aumento a 16 mg/ kg/ día. Con una dosis máxima diaria de 600 mg. Si este último aumento es bien tolerado por el paciente, se recomienda medir niveles plasmáticos de teofilina.

- Consejo de cómo administrarlo

Se debe tomar 1 hora antes de las comidas o 2 horas después de las comidas, sin embargo, si el medicamento le provoca dolor de estomago, nauseas o vómitos, puede tomarlo junto con las comidas.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

Es importante que su médico le envíe a hacerse exámenes de sangre, cada cierto tiempo, para evaluar si la dosis que usted utiliza es la correcta o es preciso modificarla.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con teofilina.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de teofilina.

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada o desea estarlo.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna y puede causar irritabilidad en el lactante, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico nuevamente.

Existen distintas **formas farmacéuticas** de este medicamento y no son intercambiables, usted debe leer cuidadosamente el rótulo del envase y asegurarse que corresponde a lo recetado por su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a teofilina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: atenolol, pindolol, propanolol, cimetidina, ciprofloxacino, claritromicina, eritromicina, fluvoxamina, mexiletina, pentoxifilina, tacrina, tiabendazol, ticlopidina, fenitoina, rifampicina, y el tabaco de cigarrillo y marihuana.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de convulsiones, **hipotiroidismo**.

- **Alimentos**

Se debe evitar consumir alimentos o bebidas con altas cantidades de cafeína como: chocolate, cocoa, té, café, bebidas cola, este medicamento puede aumentar los efectos estimulantes de estos alimentos.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: vómitos, **rash**, confusión, dolor en el pecho, mareos, convulsiones, ritmo cardíaco irregular.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor de cabeza, aumento en la frecuencia para orinar, náuseas, nerviosismo, temblor, dificultad para dormir.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: dolor abdominal continuo o severo, confusión, o cambios en el comportamiento, convulsiones, vómitos oscuros o con sangre, diarrea, mareos, dolor de cabeza, ritmo del corazón acelerado o irregular, nerviosismo, temblor continuo.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.