

Tazaroteno Crema, Gel Tópico 0,1%, gel topico 0,05%

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento.

Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Guarde este folleto; puede necesitar leerlo nuevamente

1.-Composición:

Cada 100 g de crema o gel contiene:

Tazaroteno Según lo aprobado en Registro

Excipientes : Según lo aprobado en Registro

2.-Clasificación Terapéutica:

Antipsoriásico y antiacneico

3.-Indicaciones:

Tazaroteno está indicado en el tratamiento tópico de la psoriasis y del acné vulgaris de gravedad leve a moderada.

4.-Advertencias y Precauciones:

En la medida de lo posible se debe evitar la aplicación del producto en las áreas de la piel sana circundantes a la placa psoriática, debido a su mayor sensibilidad a la irritación.

Se debe evitar el contacto con los ojos, boca, ángulos de la nariz o membranas mucosas. En caso de aplicación accidental, lavar inmediatamente con agua tibia.

No cubrir las áreas tratadas con vendajes oclusivos.

Se debe minimizar la exposición a la luz solar, incluyendo lámparas solares durante el uso de Tazaroteno. Si la exposición al sol no puede ser evitada, se recomienda utilizar ropa protectora o una pantalla solar sobre las áreas tratadas.

La seguridad y la eficacia de Tazaroteno en pacientes menores de 12 años no han sido establecidas.

Si se presenta una reacción que sugiere hipersensibilidad (reacción alérgica) o irritación severa, se debe discontinuar el uso del medicamento.

5.-Interacciones:

Se debe evitar el uso de medicamentos dermatológicos y cosméticos que posean un fuerte efecto secante o astringente. También se debe evitar su administración conjunta con medicamentos fotosensibilizantes (tiazidas, tetraciclinas, fluoroquinolonas, fenotiazinas, sulfonamidas) ya que pueden aumentar el riesgo potencial de fototoxicidad.

6.-Contraindicaciones:

No utilizar en pacientes alérgicos a Tazaroteno, derivados retinoicos o a cualquiera de los componentes de la formulación.

El producto no debe aplicarse sobre piel eczematosa, debido al riesgo de presentar irritación severa

No usar durante el embarazo o en mujeres que han previsto embarazarse

No usar durante la lactancia

7.-Efectos Adversos:

Eventualmente pueden aparecer signos de irritación, prurito, ardor, eritema, descamación, sequedad en la zona tratada o empeoramiento transitorio de la patología, efectos que usualmente no requieren atención médica. No obstante si continúan o se intensifican, consulte al médico.

8.-Modo de empleo y Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Tazaroteno debe aplicarse en las áreas afectadas una vez al día, preferentemente antes de acostarse. Se debe aplicar una fina capa del Crema, asegurándose que las áreas afectadas se encuentren limpias y secas. La aplicación no debe sobrepasar el 10% de la superficie de la piel. Normalmente el periodo de tratamiento es hasta por 12 semanas

9.-Sobredosis:

Ante la aplicación excesiva del medicamento se puede presentar un marcado enrojecimiento, descamación o molestias de la zona tratada, que de acuerdo a su severidad puede requerir atención médica

Ante la eventualidad de una ingestión accidental, consulte al médico o recurra a un centro asistencial.

10.-Presentación:

Según lo aprobado en Registro.

11.-Condiciones de Almacenamiento:

Según lo aprobado en Registro

Como todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener en su envase original

REVISADO EL 3 DE ENERO DEL 2007

