

Nombre: Tioridazina Condición de venta: con receta médica Clasificación: sedante - ansiolítico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado para:

- el tratamiento de **trastornos psicóticos** (esquizofrenia y manía en enfermedad maníaca depresiva).
- Tratamiento de la **ansiedad**
- Tratamiento de **problemas de comportamiento** severos en niños con hiperactividad e hiperexcitabilidad.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Tratamiento para adultos: 50-100 mg tres veces al día, aumentándola gradualmente hasta un máximo de 800 mg/día.
- Niños menores de 2 años: no se ha establecido la seguridad del medicamento en este grupo de la población.
- Niños entre 2-12 años: La dosis va desde los 0.5 mg/kg en dosis divididas titulando la dosis hasta obtener la respuesta esperada o hasta llegar a una dosis máxima de 3 mg/kg/día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se debe tomar junto con un vaso de agua.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

Se recomienda visitar regularmente a su médico durante el tratamiento con tioridazina, el cual debe pedirle exámenes de sangre periódicamente para observar que no exista ninguna alteración de su **fórmula sanguínea**.

3.- Precauciones

- **Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos como sedación e **hipotensión**, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con tioridazina. Generalmente se recomienda usar dosis menores en este grupo de pacientes.

- **Consumo de alcohol**

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de tioridazina.

- **Manejo de vehículos**

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa, ya que este medicamento puede causar somnolencia.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto**, no se debe utilizar durante el embarazo, asegúrese de que su médico sepa que se encuentra embarazada o puede estarlo, antes de tomar este medicamento.

- **Lactancia**

Se recomienda evitar utilizar este medicamento durante la lactancia, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. Su seguridad no está establecida para niños menores de 2 años.

- **Precauciones especiales**

Puede ser que su médico le cambie varias veces la dosis de medicamento con el propósito de establecer la mejor dosificación para usted. No tome más medicamento ni con más frecuencia que la indicada por su médico.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Este medicamento puede causar una mayor sensibilidad de su piel al sol, presentándose síntomas como picazón **rash**, decoloración de la piel, o quemaduras severas en la piel por el sol. Por lo que se recomienda no tomar sol en forma directa especialmente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, y utilizar un factor solar 15.

Informe a su médico si toma otras medicinas, en especial si toma medicamentos para dormir, para la alergia, resfrío, etc.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a tioridazina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si padece de **glaucoma** de ángulo cerrado.

Si presenta algún tipo de problemas con el ritmo cardíaco o si tiene la presión arterial muy alta o muy baja.

Tampoco debería utilizar este medicamento si está usando medicamentos para la depresión, para la hipertensión arterial, para problemas con el ritmo cardíaco u otros antipsicóticos.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: enalapril, captopril, propanolol, atenolol, alprazolam, diazepam, analgésicos en general.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **enfermedad de Parkinson, adenoma de la próstata**.

- Exámenes de laboratorio:

Este medicamento puede interferir en el resultado de exámenes de embarazo, ya que en algunos casos ha arrojado falsos positivos.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: temblor en las manos, movimientos incontrolados de las extremidades, secreción de leche, problemas de **eyaculación**, mareos al levantarse, mayor sensibilidad a la luz solar, piel y ojos de color amarillo, fiebre, úlceras en la boca.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: somnolencia, sequedad de boca.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: aumento de la temperatura corporal, palidez.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.