

Nombre: Zidovudina (AZT) Condición de venta: con receta médica Clasificación: antiviral Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado en el manejo de pacientes con infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sintomáticos o con síntomas iniciales asociados a la progresión de la enfermedad por VIH, manejo de pacientes con enfermedad avanzada por VIH tales como aquellos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o con el complejo relacionado al SIDA (crs/arc).

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 600 mg./día en dosis divididas. 200 mg. tres veces al día o 300 mg, dos veces al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento junto con las comidas para así evitar la aparición de efectos secundarios.

Si toma más medicamentos cumpla totalmente la terapia.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. Se recomienda que visite regularmente a su médico para que puede evaluar la evolución de su enfermedad.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de zidovudina.

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

- Embarazo

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el **feto**, se ha observado que zidovudina disminuye la posibilidad de infección del feto por el VIH. Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

- **Lactancia**

Las mujeres que portan VIH no deben amamantar a sus hijos, para evitar la transmisión de la infección al niño. Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

Los niños son mas sensibles a los efectos adversos de este medicamento, el pediatra debe evaluar el tratamiento recomendable para su niño.

- **Precauciones especiales**

El uso de zidovudina no previene el contagio de la infección a otras personas, por lo que debe tener las precauciones necesarias como utilizar condón (usted o su pareja) siempre que mantenga relaciones sexuales (tanto vaginales, anales u orales), no debe compartir jeringas con otras personas, no debe donar sangre.

El uso de espermicidas puede ayudar a prevenir la infección pero sólo si lo utiliza además del condón.

Los métodos anticonceptivos orales, diafragmas, t de cobre, supositorios vaginales, etc. no previenen de adquirir la infección por VIH, por lo que necesariamente debe utilizar condones para mantener relaciones sexuales.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a zidovudina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: amfotericina B, medicamentos para el cáncer, propiltiouracilo, azatioprima, cloramfenicol, colchicina, ciclofosfamida, flucitosina, ganciclovir, interferon, mercaptopurina, metotrexato, plicampicina, claritromicina, probenecid.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de anemia u otras enfermedades a la sangre, bajas cantidades de ácido fólico o vitamina B 12 en la sangre.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: fiebre, escalofríos, úlceras en la garganta, piel pálida, debilidad, mal estar estomacal, confusión, convulsiones, sensación general de mal estar, pérdida del apetito, debilidad muscular, cambios en el carácter, nauseas.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o

se intensifican: dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, dificultad para dormir, aparición de manchas azul en las uñas.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas y vómitos, dolor de cabeza, mareos o somnolencia.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.