

AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO 200/28,5 GRANULOS PARA SUSPENSION ORAL

Lea todo este folleto cuidadosamente antes de empezar a usar esta medicina.

- Guarde este folleto. Puede que necesite leerlo otra vez.
- Si tiene alguna pregunta adicional, pregunte a su médico o farmacéutico.
- Esta medicina fue prescrita sólo para su niño(a), no la recete a otros. Puede que no sea adecuada para ellos, incluso si tienen los mismos síntomas.
- Si cualquiera de los efectos secundarios se vuelve serio, o si se da cuenta de algún efecto secundario no mencionado en este folleto, por favor dígaselo a su médico o farmacéutico.

Composición:

Cada pipeta para beber con gránulos para suspensión oral contiene:
Amoxicilina 200 mg y ácido clavulánico 28,5 mg.
Excipientes. Según lo aprobado en registro

¿Qué es este medicamento?

Este medicamento es un antibiótico para tratar las infecciones. Pertenece a un grupo de antibióticos llamados "Penicilinas".

Este medicamento trabaja matando a las bacterias que pueden provocar las infecciones.

¿Por qué su médico le prescribió este medicamento a su niño(a)?

Este medicamento puede tratar una amplia gama de infecciones bacterianas incluso aquellas del pecho (bronquitis o neumonía), amígdalas (amigdalitis), senos nasales (sinusitis), oídos, piel (incluso mordeduras de animales), la vejiga o la uretra (el tubo que lleva la orina de la vejiga), riñones, dientes y encías (abscesos).

Antes de que su niño(a) use este medicamento comuníquese a su médico si alguno de los siguientes puntos puede aplicarse:

- Su niño(a) ha tenido erupción de la piel o hinchazón de la cara o del cuello al tomar un antibiótico.
- Usted sabe que su niño(a) es alérgico a la penicilina (o a cualquier otro antibiótico).
- Su niño(a) ha tenido dolencias serias – tales como problemas hepáticos – cuando ha tomado un antibiótico.
- Su niño(a) ha sido tratado por problemas en el hígado o el riñón.
- Su niño(a) ha sido tratado con alguno medicamentos (como warfarina) para prevenir la formación de coágulos de sangre.
- Su niño(a) ha sido tratado con alopurinol en afecciones tales como gota que pueden ser provocadas por la acumulación de ácido úrico.
- Su niño(a) tiene mononucleosis infecciosa.
- Su médico le ha informado que su niño(a) no tolera ciertos azúcares.

Si es así, su médico puede decidir administrar a su niño(a) un medicamento diferente o cambiar la dosis de este medicamento.

Si usted es un adulto que usa este medicamento, hágale saber a su médico si está embarazada (o si piensa estarlo) o si está amamantando.

¿Cómo dar este medicamento a su niño(a)?

Su médico le dirá que cantidad de medicamento dar a su niño(a) cada día. Si usted tiene alguna duda acerca de Este medicamento, hable con su médico o farmacéutico.

Este medicamento no es adecuado para niños menores de 2 años de edad y para pacientes incapaces de beber al usar una "pajita" de bebida corriente.

La dosis que su médico le indique va a depender del tipo de infección que tenga su niño(a) y de la edad y del peso de éste. La dosis habitual es mostrada en la tabla siguiente. Cada dosis única debe ser tomada dos veces al día, por ejemplo, en la mañana y en la noche.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Edad del niño(peso corporal)	Dosis habitual (infección leve a moderada)	Dosis habitual (infección más severa)
2 a 6 años (13 a 21 kg)	1 pipeta de 200/28,5 mg dos veces al día	2 pipetas de 200/28,5 mg dos veces al día.

Para mejores resultados, su niño(a) debe usar Este medicamento justo antes de las comidas.

Trate de dar este medicamento como parte de la rutina diaria, por ejemplo al comienzo de una comida, una vez en la mañana y una vez en la noche.

Pero recuerde, siempre que le de a su niño el medicamento, debe espaciar las dosis tan regularmente como sea posible en el transcurso del día.

Trate de no darle a su niño más de una dosis única cada 12 horas y nunca administre dos dosis únicas dentro de un plazo de menos cuatro horas.

Nunca administre más de la dosis recomendada para cada día.

Siga dando a su niño(a) el medicamento hasta que se termine el tratamiento prescrito, aún si parece mejorar.

Su niño(a) necesita de cada dosis para ayudar a librarse de la infección. Si usted deja de darle a su niño(a) el medicamento antes de que termine el tratamiento, algunas bacterias pueden sobrevivir y provocar que la infección reaparezca.

Si su niño sigue aún enfermo después de tomar todo el medicamento, consulte a su médico.

Usted no debe administrar a su niño(a) este producto por más allá de dos semanas sin antes consultar a su médico nuevamente.

¿Qué pasa si olvido dar una dosis?

Si usted olvida dar una dosis no se preocupe – adminístresela tan pronto como lo recuerde. Pero no de a su niño(a) la dosis siguiente demasiado luego. Trate de esperar alrededor de 4 horas antes de administrar la dosis siguiente. Siempre trate de mantener las dosis uniformemente separadas.

¿Qué hago si mi niño(a) ha tomado demasiado medicamento?

Si accidentalmente le dio a su niño(a) demasiadas dosis de Este medicamento o si sospecha de que su niño ha tomado medicina adicional, contacte a su médico o al Servicio de Urgencia del hospital local de inmediato. Muestre al médico la caja o el sobre del medicamento.

Información acerca de los posibles efectos secundarios :

Este medicamento puede provocar algunas veces a su niño diarrea o una molestia estomacal o puede hacerlos sentir mal o estar enfermos. Si esto sucede, los síntomas son generalmente leves y usted puede prevenirlos dándole a su niño cada dosis justo antes de las comidas.

Algunas personas hacen un rash (erupción de la piel) al tomar antibióticos. Si su niño(a) empieza a tener picazón o un rash, detenga la administración de Este medicamento e informe inmediatamente a su médico. Otros efectos secundarios incluyen hinchazón de la cara y problemas al respirar. Pero estos son extremadamente raros. Cuénteles a su médico inmediatamente si nota estos síntomas.

Algunos niños pueden hacer candidiasis (una infección por levaduras en la boca, vagina o en los pliegues de la piel) durante el tratamiento o poco después de éste. Usted puede pedir a su doctor un tratamiento para la candidiasis.

Raramente, a algunos niños pueden manchárseles los dientes con una débil coloración amarillo claro/café. Estas manchas generalmente desaparecen poco después del tratamiento si los dientes son cepillados regularmente.

Muy rara vez, algunos niños experimentan hiperactividad, mareos, dolor de cabeza y convulsiones. Estos síntomas son reversibles.

Muy rara vez este medicamento puede formar cristales en la orina (generalmente sólo son visibles al microscopio) que pueden caracterizarse por una orina turbia o por dificultad/malestar al orinar.

Recuerde a su médico si a su niño le están haciendo análisis de sangre, porque amoxicilina/ácido clavulánico algunas veces provoca cambios a corto plazo en el recuento de las células sanguíneas. Rara vez también puede ocasionar un incremento en el tiempo de coagulación.

Al igual que la mayoría de los medicamentos, amoxicilina/ácido clavulánico puede causar algunas veces reacciones raras y serias. Consulte inmediatamente a su médico si:

- su niño(a) tiene diarrea severa con sangrado;
- usted nota que la orina de su niño adquiere un color más oscuro o si las heces adquieren un color más pálido; o
- usted nota que la piel de su niño o la parte blanca de sus ojos adquieren una coloración amarilla.

Algunas de estas reacciones pueden tardar y aparecer varias semanas después de haber terminado el tratamiento.

Si su niño tiene algún otro problema al tomar este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Presentación:

Según lo aprobado en Registro

Condiciones de Almacenamiento:

- Según lo aprobado en Registro
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No use después de la fecha de caducidad indicada .

REVISADO MAYO 2007