

## **ACIDO ACETILSALICILICO/ DIPIRIDAMOL**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su médico.

### **¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO?**

Cada cápsula de liberación prolongada contiene:

- Dipiridamol 200 mg
- Acido acetilsalicílico 25 mg
- Excipientes: según lo aprobado en el registro.

### **¿PARA QUE SE USA ACIDO ACETILSALICILICO/ DIPIRIDAMOL?**

Este medicamento está indicado para la prevención del accidente vascular encefálico y de ataque isquémicos transitorios.

Este medicamento debe ser usado sólo por indicación de su médico.

### **¿CUÁL ES LA ACCIÓN TERAPEUTICA DE ESTE MEDICAMENTO?**

Antiagregante plaquetario

### **¿CUÁNDO NO USAR ACIDO ACETILSALICILICO/ DIPIRIDAMOL?**

No debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

- Antecedentes de reacción alérgica a alguno de los componentes del medicamento.
- Si usted padece úlcera gástrica activa, úlcera duodenal, o enfermedades que cursen con sangramiento.
- Antecedentes de reacción alérgica a antiinflamatorios no esteroideos (ej.: diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, etc.)
- Si Ud. padece síndrome asmático, rinitis y pólipos nasales.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO**

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico. Considerar los siguientes aspectos:

### **Pacientes alérgicos:**

Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

### **Embarazo y lactancia:**

Al igual que con todo fármaco, este medicamento debe ser administrado durante el embarazo y lactancia sólo en caso de real necesidad. Debe ser utilizado con precaución durante los primeros dos trimestres del embarazo y debe ser evitado en el tercer trimestre.

Tanto el dipiridamol como el ácido acetilsalicílico pasan a la leche materna.

Ud. debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras esté amamantando

### **Uso pediátrico:**

Este medicamento no es para uso en niños.

### **Uso geriátrico:**

No existe información que contradiga el uso de este medicamento en pacientes mayores de 65 años. Sin embargo, utilice este medicamento sólo bajo prescripción médica. Puede que el paciente necesite de un ajuste de dosis.

### **Pacientes con insuficiencia renal o hepática:**

Se debe evitar el uso de ácido acetilsalicílico en pacientes con insuficiencia renal severa e insuficiencia hepática severa.

### **Consumo de alcohol:**

Como todo medicamento, se debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento, ya que el consumo de éste puede exacerbar los efectos adversos asociados a este medicamento.

Se recomienda informar a pacientes que consumen bebidas alcohólicas sobre los riesgos aumentados de sangramiento cuando se toma ácido acetilsalicílico en conjunto con bebidas alcohólicas en forma prolongada.

### **Efectos en la capacidad de conducir y/o operar maquinaria:**

No existe información específica que sugiera que este medicamento influye en la capacidad para conducir o manejar maquinaria: sin embargo, en caso de experimentar mareos durante el tratamiento (véase efectos adversos), se debe evitar la conducción de vehículos y el manejo de maquinaria

### **Otras precauciones:**

- No sustituya los componentes individuales de la acido acetil salicilico y el dipiridamol, por el producto de la combinación de la acido acetil salicilico y el dipiridamol de liberación prolongada.

- Dado que el uso de ácido acetilsalicílico en niños y los adolescentes, durante el padecimiento de enfermedades víricas puede dar lugar a una grave condición (el síndrome de Reye), mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
- Cumpla con todas las citas con su doctor y exámenes de laboratorio. Su doctor podría ordenar algunos exámenes de laboratorio para determinar la respuesta de su cuerpo al ácido acetilsalicílico y dipiridamol de liberación prolongada.
- No deje que otras personas tomen su medicamento. Pregúntele al farmacéutico cualquier duda que tenga sobre cómo renovar la prescripción de su medicamento.

### **¿QUÉ INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS PRESENTA ESTE MEDICAMENTO?**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones).

Informe a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica.

Si usted está usando cualquiera de los siguientes medicamentos, comuníquelos a su médico: anticoagulantes, cefamandol, cefaperazona, cefotetán, ácido valproico, divalproex, analgésicos, antiinflamatorios, pentoxifilina, plicamicina, tricarcilina, antidiabéticos orales (ej: clorpropamida, glibenclamida, tolbutamida, etc.), metotrexato, espironolactona, probenecid, sulfpirazona, vancomicina.

### **¿QUÉ DEBO DECIRLE A MI MÉDICO ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

Es importante que usted comunique a su médico si padece o tiene antecedentes de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes: enfermedades cardíacas, infarto al miocardio reciente, miastenia gravis, insuficiencia renal o hepática severa, úlcera gástrica, anemia, hemofilia, antecedentes de asma, rinitis y polipos nasales, presión baja.

### **¿CÓMO ADMINISTRAR Y EN QUE CANTIDAD?**

Vía de administración: oral

La dosis debe ser según prescripción médica, adjunto al tiempo de tratamiento que será único de acuerdo a su estado de salud, sin embargo, la dosis comúnmente recomendada es:

- 1 cápsula dos veces al día, generalmente 1 por la mañana y otra por la tarde, preferencialmente con las comidas. Las cápsulas debe tragarse enteras sin masticar.

### **EFFECTOS NO DESEADOS:**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de ellos pueden requerir atención médica.

Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los síntomas siguientes: diarrea, sangramiento digestivo o nasal, erupción de la piel, mareos, zumbido de oídos.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico: dolor de cabeza, bochornos, pulso acelerado.

Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el médico.

### **¿QUÉ HACER SI OLVIDA LA ADMINISTRACIÓN DE UNA DOSIS?**

Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sátese la que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó

### **SOBREDOSIS:**

Dado a la relación de dipiridamol y ácido acetilsalicílico, en caso de sobredosificación predominarán los síntomas de sobredosis con dipiridamol. Dado al escaso número de observaciones, la experiencia con sobredosificación con dipiridamol es limitada. Síntomas como sensación de calor, rash, sudoración, taquicardia, inquietud, sensación de debilidad, mareos, baja de la presión sanguínea y quejas anginosas son esperables.

Los signos y síntomas de una sobredosificación aguda moderada con ácido acetilsalicílico son hiperventilación, tinitus, náuseas, vómitos, alteración de la visión y de la audición, mareos y estados de confusión

Si accidentalmente toma demasiado comprimidos, o si un niño traga varios, póngase en contacto con su médico inmediatamente o acuda a un centro asistencial, de preferencia llevando el presente prospecto.

### **¿CÓMO ALMACENAR?**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz, humedad y a la temperatura señalada en el rótulo.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

**Revisado: 25 febrero 2008**