

AMLODIPINO

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su médico.

¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO?

Cada comprimido contiene:

- Amlodipino (como Besilato) 5 ó 10 mg
- Excipientes: según lo aprobado en el registro.

¿PARA QUE SE USA EL AMLODIPINO?

Tratamiento de la hipertensión arterial.

Es usado como monoterapia o en combinación con otros agentes antihipertensivos.

También está indicado en el tratamiento de la angina crónica estable y en la angina Prinzmetal, ya sea sólo o en combinación con otros agentes antianginosos.

¿CUÁL ES LA ACCIÓN TERAPEUTICA DE ESTE MEDICAMENTO?

Antihipertensivo. Antianginoso

¿CUÁNDO NO USAR EL AMLODIPINO?

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Pacientes con hipotensión severa.
- Embarazo y lactancia.
- Alergia a Amlodipino.
- Pacientes con riesgo de hiperplasia gingival.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico. Considerar los siguientes aspectos:

Pacientes alérgicos:

Informe a su médico su Ud. alguna vez ha tenido reacciones alérgicas al efectuar un tratamiento con amlodipino o con cualquier otra sustancia (alimentos, colorantes, etc.) u otros medicamentos.

Embarazo y lactancia:

En ambos casos, su uso estaría indicado sólo si los potenciales beneficios sobre la madre superan los potenciales riesgos sobre el feto o lactante.

Estenosis aórtica:

Aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca debido a la impedancia fija al flujo a través de la válvula aórtica.

Insuficiencia cardíaca congestiva:

El amlodipino debe emplearse con precaución debido al ligero riesgo de efecto inotrópico negativo.

Uso pediátrico:

No existe información acerca de la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos.

Uso geriátrico:

Estos pacientes pueden ser más sensibles a los efectos hipotensores de amlodipino o por un aumento de la vida media de este medicamento.

Disfunción hepática:

Puede reducirse el clearance de amlodipino, ya que sufre un extenso metabolismo hepático; la vida media de eliminación puede prolongarse 60 horas.

Ingesta de alcohol:

Limite la ingesta del alcohol mientras esté tomando esta medicina, ya que se podrían intensificar los efectos adversos.

Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos y usar maquinaria:

Con base en la experiencia clínica con amlodipino, es improbable que disminuya la capacidad para conducir vehículos o para operar maquinaria de precisión.

Otras precauciones:

Se recomienda mantener una buena higiene dental y visitar con frecuencia al dentista para limpiarse los dientes, ya que este medicamento puede provocar una sensibilidad anormal al dolor, hemorragia e hiperplasia de las encías.

Se debe visitar regularmente al médico para comprobar el progreso durante el tratamiento.

¿QUÉ INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS PRESENTA ESTE MEDICAMENTO?

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: hinchazón de pies y tobillos, mareos, palpitaciones, angina o dolor en el pecho, bradicardia, hipotensión, orina de color amarillo oscuro, ojos o piel de color amarillo, sensación de mareo al ponerse de pie después de estar sentado o acostado.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor abdominal, enrojecimiento de la cara, dolor de cabeza, somnolencia, fatiga, náuseas

¿DEBO INFORMAR AL MÉDICO SI SUFRO DE OTRAS ENFERMEDADES ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO?

Si, dado que el efecto del medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: hipotensión, enfermedad hepática, enfermedad cardíaca congestiva, estenosis aórtica.

¿CÓMO ADMINISTRAR Y EN QUE CANTIDAD?

Via de administración: oral.

Adultos y niños mayores de 12 años:

Antihipertensivo o antianginoso: tanto para el tratamiento de la hipertensión como la angina, se recomienda una dosis inicial de 5 mg una vez al día, que puede aumentarse hasta un máximo de 10 mg según la respuesta del paciente.

Se recomienda una dosis antihipertensiva inicial de 2,5 mg en los pacientes de edad avanzada, frágiles o de pequeña estatura, en los pacientes con disfunción hepática o cuando se combina el amlodipino con otro tratamiento antihipertensivo.

Se recomienda una dosis inicial antianginosa de 5 mg para pacientes de edad avanzada y para pacientes con disfunción hepática.

Niños: no se ha establecido la seguridad ni eficacia del uso de amlodipino en niños.

IMPORTANTE: Cumpla estrictamente con el tratamiento; no use más cantidad, con mayor frecuencia ni durante más tiempo que lo prescrito por su médico.

Si ha usado este medicamento con regularidad durante varias semanas, no suspenda la medicación en forma brusca. Consulte a su médico sobre la mejor forma de ir reduciendo gradualmente la cantidad que toma, antes de dejar de utilizarlo por completo.

EFFECTOS NO DESEADOS:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: hinchazón de pies y tobillos, mareos, palpitaciones, angina o dolor en el pecho, bradicardia, hipotensión, orina de color amarillo oscuro, ojos o piel de color amarillo, sensación de mareo al ponerse de pie después de estar sentado o acostado.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor abdominal, enrojecimiento de la cara, dolor de cabeza, somnolencia, fatiga, náuseas.

¿QUÉ HAGO SI OLVIDO TOMAR UNA DOSIS?

Si Ud. olvida una dosis, tómela lo antes posible; no lo haga si falta poco tiempo para la dosis siguiente. No duplique la dosis.

SOBREDOSIS:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico

¿CÓMO ALMACENAR?

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz, humedad y a la temperatura señalada en el rotulo.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

Revisado: 8 febrero 2008