

AZELASTINA

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su médico.

¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO?

Cada comprimido contiene:

- Anfebutamona clorhidrato 100 mg
- Excipientes: según lo aprobado en el registro.

¿PARA QUE SE USA LA ANFEBUTAMONA?

Tratamiento de la picazón de los ojos asociado a conjuntivitis alérgica estacional en adultos y niños mayores de 4 años.

¿CUÁL ES LA ACCIÓN TERAPEUTICA DE ESTE MEDICAMENTO?

Antidepresivo.

¿CUÁNDO NO USAR LA ANFEBUTAMONA?

Cuando el paciente presente hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los componentes de la formulación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico. Considerar los siguientes aspectos:

Pacientes alérgicos:

Informe a su médico si Ud. alguna vez ha tenido reacciones alérgicas a este medicamento o con cualquier otra sustancia (alimentos, colorantes, etc.) u otros medicamentos.

Embarazo

Ud. debe comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo.

Lactancia:

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que no se recomienda su uso si Ud. esta amamantando.

Uso pediátrico.

Este medicamento no debe usarse en niños menores de 16 años.

Uso geriátrico:

Este medicamento ha sido usado en un número reducido de pacientes de la tercera edad sin encontrarse efectos o problemas diferentes a los observados en adultos jóvenes.

Pacientes con enfermedad cardíaca:

Debe administrarse con precaución a pacientes con historia reciente de infarto al miocardio o insuficiencia cardíaca inestable, por no haber antecedentes sobre la seguridad de su uso.

Ingesta de alcohol:

Evite beber alcohol, mientras está en tratamiento con este medicamento. La ingesta de alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar convulsiones.

Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos y usar maquinaria:

Antes de conducir un vehículo o manejar maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad que requiera su completa concentración y que impliquen un riesgo de seguridad, asegúrese del efecto que tiene sobre Ud. este medicamento.

Otras precauciones:

No utilizar este producto en inyección peri o intraocular.

Al igual que con otras soluciones oftálmicas, no se recomienda utilizar azelastina solución para gotas oftálmicas mientras se llevan lentes de contacto.

Azelastina no está indicado para el tratamiento de infecciones oculares..

¿QUÉ INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS PRESENTA ESTE MEDICAMENTO?

En caso de que exista un tratamiento conjunto con otro colirio, estos deben ser aplicados con 15 minutos de diferencia.

¿DEBO INFORMAR AL MÉDICO SI SUFRO DE OTRAS ENFERMEDADES ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO?

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

Ud. debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes:

Anorexia nerviosa (ya sea la sufra actualmente o la haya sufrido en el pasado), bulimia (ya sea que la sufra actualmente o la haya sufrido en el pasado), drogadicción, daño o antecedentes de daño cerebral, convulsiones o antecedentes de haber desarrollado convulsiones en alguna etapa de su vida, alteraciones nerviosas, mentales o emocionales, desordenes bipolares (maniaco-depresivos), presión alta, problemas cardíacos, enfermedades renales o hepáticas.

¿CÓMO ADMINISTRAR Y EN QUE CANTIDAD?

Use este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia de la que su médico le indique:

- Tome este medicamento al menos con un intervalo de 8 horas entre cada dosis (si aumenta la frecuencia de administración se expone a desarrollar convulsiones).
- No triture o rompa el comprimido, tómelo entero con un vaso de agua de preferencia con alimentos.
- No exceda la dosis recomendada por su médico tratante.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante como antidepresivo se recomiendan una dosis única inicial de 150 mg la que puede ser aumentada, de acuerdo a la respuesta y tolerancia hasta un máximo de 300 mg al día, administrado en dos dosis de 150 mg. Aumento que se debe producir a intervalos de una semana como mínimo.

IMPORTANTE: no se debe sobrepasar de 400 mg/día de anfebutamona comprimidos de liberación prolongada.

EFFECTOS NO DESEADOS:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los síntomas siguientes:

Cualquier signo de alergia (picazón, enrojecimiento de la piel, ronchas), agitación, ansiedad, zumbido en los oídos, confusión, alucinaciones, paranoia o problemas de concentración y convulsiones, náuseas, vómitos, dolor de cabeza severo, anorexia, sequedad de la boca, sudoración excesiva, insomnio, temblor y pérdida de peso inusual.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico.

¿QUÉ HAGO SI OLVIDO TOMAR UNA DOSIS?

Si Ud. olvida una dosis, no la tome y siga la pausa de dosificación regular. No duplique.

SOBREDOSIS:

La sobredosis de anfebutamona se presenta con los siguientes síntomas:

Alucinaciones, pérdida de conciencia, náuseas, vómitos, taquicardia (alta frecuencia de latidos cardíacos) que puede pasar a bradicardia (baja frecuencia de latidos cardíacos), o paro cardíaco

Debe acudir de inmediato a un centro médico de urgencia ante la presencia de estos síntomas.

¿CÓMO ALMACENAR?

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz, humedad y a la temperatura señalada en el rotulo.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

Revisado: 8 febrero 2008