

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ANGIN - HEEL SD COMPRIMIDOS SUBLINGUALES
Folleto de Información al Médico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS CON PRODUCTOS NUEVOS	
06 MAY 2019	
N° Ref.:	MT 1080856/18
N° Registro:	H-728/15
Firma Profesional:	<i>[Firma]</i>

X comprimidos sublinguales

Angin-Heel® SD comprimidos sublinguales

Medicamento homeopático
 Hecho en Alemania

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Hydrargyrum cyanatum D8 30 mg; Phytolacca americana D4 30 mg; Apis mellifica D4 30 mg; Arnica montana D4 30 mg; Hepar sulfuris calcareum D6 60 mg; Atropa belladonna D4 60 mg. Como excipientes: ~~estearato de magnesio y lactosa~~. **De acuerdo a última fórmula autorizada en el registro sanitario.**

Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Indicaciones: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de amigdalitis aguda.

Posología:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis pediátricas

6 -11 años	1 comprimido 2 veces al día
2 - 5 años	1 comprimido 1 a 2 veces al día
< 2 años	1 comprimido al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años

1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Dosis Pediátrica Aguda:

6 -11 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2 - 5 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

< 2 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 4 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ANGIN - HEEL SD COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

Contraindicaciones:

No debe administrarse en caso de hipersensibilidad conocida al veneno de las abejas, al producto o a alguno de sus componentes.

Efectos secundarios:

- Podría aparecer una leve irritación a la mucosa bucal.
- Eventualmente podría producirse sialorrea (salivación excesiva), si esto ocurre se debe suspender el tratamiento.

Advertencias:

- No administrar durante el embarazo o la lactancia, salvo indicación médica.
- No se ha demostrado que este medicamento prevenga las complicaciones de la faringo-amigdalitis estreptocócica.
- No use dosis mayores a las recomendadas. Si los síntomas persisten o empeoran, luego de 3 días de tratamiento, el paciente deberá consultar al médico.
- El tratamiento por más de 7 días debe realizarse bajo supervisión médica.
- Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.

Interacciones con otros medicamentos:

No se han descrito.

Precaución: Este medicamento contiene lactosa.

Vía de administración: Sublingual.

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Condiciones de Almacenamiento:

- Mantener bien cerrado en su envase original a no más de 25 °C, protegido de la luz y la humedad.
- Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

Bibliografía:

German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

Reg. I.S.P.N° H-728



REF: MT1080856/18

REG. ISP N° H-728/15

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ANGIN - HEEL SD COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

Fabricado por y bajo licencia

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg – Str 2-4
76532 Baden - Baden
Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos 260, piso 6
Las Condes - Santiago . Chile

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

