

Ref.: RF545534/14

Reg. I.S.P. N° F-21184/14

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ACCUALAXAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL**

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

Accualaxan polvo para solución oral

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Laxante osmótico.

**INDICACIÓN**

Se indica como laxante en el tratamiento del estreñimiento ocasional.

**COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN**

Cada sachet contiene:

Polietilenglicol **Macrogol** 3350.....17g

Cada frasco contiene:

Polietilenglicol **Macrogol** .....300 X g

**DESCRIPCIÓN**

El Polietilenglicol **Macrogol** 3350 es un polímero lineal de óxido de etileno.

El Polietilenglicol **Macrogol** 3350 es agente osmótico que, debido a su estructura, induce la retención de agua por la materia fecal, con lo cual ésta aumenta su volumen, reblandeciendo su consistencia y facilitando su eliminación.

**FARMACOCINÉTICA**

El Polietilenglicol **Macrogol** 3350 no se altera a lo largo del intestino. **Realmente** no se absorbe por el tracto gastrointestinal (debido a su elevado peso molecular) y no tiene actividad farmacológica conocida. En caso que se absorbiera, se excretaría por vía urinaria.


Cuando se usa como tratamiento del estreñimiento, la respuesta inicial se produce al cabo de 2-4 días.

No se ha demostrado que Polietilenglicol **Macrogol** 3350 tenga algún efecto sobre la absorción activa y la secreción de glucosa o electrolitos. ~~No produce taquifilaxia.~~

**POSOLOGIA**

Se administra vía oral.

**Dosis habitual en adultos y adolescentes mayores de 17 años de edad:**



**FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ACCUALAXAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL**

La dosis recomendada de Polietilenglicol **Macrogol** 3350 para el estreñimiento es de 17 g de polvo por día durante 7 días como máximo.

**No se recomienda en niños y adolescentes menores de 17 años**

**MODO DE USO**

El contenido de un sobre de Polietilenglicol **Macrogol** 3350 debe ser disuelto en 200 mL de agua hervida (**enfriada**) o purificada, jugo, bebida, café o té.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

**El uso frecuente y prolongado de este laxante u otro puede crear hábito.**

Los pacientes con estreñimiento deben ser evaluados con una historia clínica detallada que incluya un examen físico completo para evaluar las condiciones metabólicas, endocrinas y neurológicas asociadas, así como la medicación concomitante que estén tomando y que pudiera contribuir o agravar la constipación. En algunos pacientes será importante realizar un estudio radiológico o endoscópico del colon.

Debe evitarse el uso de Accualaxan polvo para solución oral en pacientes con síntomas **sugerentes** de obstrucción intestinal como: náuseas, vómitos, dolor abdominal o distensión, impactación fecal, estenosis o adherencias intestinales. Además se aconseja no usar este producto en caso de fiebre.

Los pacientes deben ser informados sobre hábitos alimenticios y defecatorios adecuados ( como dietas con alto contenido de fibra) y cambios del estilo de vida (ingesta adecuada de líquidos y ejercicio regular) con el objetivo de mejorar el funcionamiento intestinal.

El uso frecuente, prolongado o excesivo de Accualaxan polvo para solución oral, puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y dependencia a los laxantes.

La acción de los laxantes en pacientes con historia clínica de constipación puede ~~no ser inmediata y~~ requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal.

**EMBARAZO Y LACTANCIA**

Se desconoce si Polietilenglicol **Macrogol** 3350 puede causar daño fetal cuando es administrado durante el embarazo o que afecte la capacidad reproductiva. Dado que el Polietilenglicol **Macrogol** 3350 prácticamente no se absorbe en el intestino, su empleo durante el embarazo ~~o en el periodo de lactancia queda a juicio~~ debe decidirlo el médico de acuerdo a las condiciones de la paciente. La prescripción de este medicamento en mujeres durante la lactancia puede ser una opción en caso de necesidad.

**Geriatría: se debe usar con precaución en los pacientes de edad avanzada. En caso que se produzca diarrea se debe suspender el tratamiento.**

**CONTRAINDICACIONES**

Accualaxan polvo para solución oral no debe ser utilizado en los siguientes casos:

- Pacientes que presenten hipersensibilidad al Polietilenglicol **Macrogol** 3350.
- Pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ACCUALAXAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL**

---

- Afecciones inflamatorias graves del intestino (como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y megacolon tóxico).
- Perforación o riesgo de perforación intestinal.
- Dolor abdominal de causa indeterminada.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

El Polietilenglicol **Macrogol** 3350 no ha demostrado tener interacciones con otros medicamentos.

**REACCIONES ADVERSAS**

Puede presentarse: náuseas, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. Las dosis altas pueden producir diarrea y un mayor número de evacuaciones.

**SOBREDOSIFICACION**

No se han reportado casos de sobredosis. La producción de diarrea sería el evento esperado más importante. Ante una sobredosis de Polietilenglicol **Macrogol** 3350, se puede presentar deshidratación debida a la diarrea. Administrar líquidos suficientes.

