

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ADRISIN COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

-Heel

Folleto de información al Profesional

Comprimidos sublinguales

Adrisin comprimidos sublinguales

Medicamento homeopático

Vía de Administración: Sublingual

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Acidum arsenicosum D8, Acidum formicicum D8, Acidum sulfuricum D22, Arctium D8, Arnica montana D6, Graphites D10, Histaminum dihydrochloricum D8, Histaminum dihydrochloricum D12, Histaminum dihydrochloricum D22, Ledum palustre D8, Lycopodium clavatum D6, Pix pinaceae D10, Selenium D12, Stibium sulfuratum nigrum D10, Strychnos ignatii D6, Sulfur D12, Tellurium metallicum D10, Thuja occidentalis D6; 15.0 mg cada uno. Excipientes: Lactosa monohidrato, Estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Indicación: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en cuadros alérgicos, principalmente cutáneos y también respiratorios, desde los 6 años de edad.

Usos: Para el alivio temporal de los síntomas de la alergia: estornudos, secreción nasal, ojos llorosos, irritaciones de la piel. Puede ser utilizado también como soporte preventivo (profiláctico) en el manejo de estas condiciones.

Advertencias: No use dosis mayores a las recomendadas. Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, lo cual es pasajero y no reviste mayor importancia. Si los síntomas persisten o empeoran, luego de 3 días de tratamiento, consulte al médico.

Contraindicaciones: Antecedentes de hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

Efectos secundarios: No se han descrito.

En caso de que usted experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ADRISIN COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

-Heel

Interacciones con otros medicamentos: Si bien no se han descrito, el efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Modo de uso:

Dosis estándar:

Adultos y mayores de 12 años: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido, 3 veces al día.

Niños de 6 a 11 años: 1 comprimido dos veces al día.

Niños de 2 a 5 años: 1 comprimido una o dos veces al día.

Niños menores de 2 años: 1 comprimido al día.

Dosis aguda:

Adultos y mayores de 12 años: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido hasta 12 veces al día.

Niños de 6 a 11 años: 1 comprimido hasta 8 veces al día.

Niños de 2 a 5 años: 1 comprimido hasta 6 veces al día.

Niños menores de 2 años: 1 comprimido hasta 5 veces al día.

Presentación: Envase con 50 comprimidos.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Condiciones de almacenamiento: Almacenar a no más de 25°C. Proteger del calor, de la luz solar directa y de la humedad. Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener lejos del alcance de los niños.

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos 260, piso 6

Las Condes - Santiago, Chile