

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ECHIPROP  
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES



**FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**

**ECHIPROP  
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**

**1. COMPOSICIÓN**

Cada 100 mL contiene

Echinacea D1	50 mL
Propolis D1	50 mL

**2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA**

Medicamento Homeopático.

**3. MECANISMO DE ACCIÓN**

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

**4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.**

A continuación se describen las principales observaciones de la Patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

**Echinacea:** Tratamiento de apoyo en enfermedades infecciosas graves que cursan con fiebre.

**Propolis:** Inflamación no purulenta de las mucosas de vías aéreas. Enfermedades de la piel.

**5. INDICACIONES**

**Medicamento homeopático útil como** coadyuvante en el tratamiento de enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias tales como amigdalitis, rinitis, faringitis, síntomas del resfrío y estados gripales que puedan o no cursar con fiebre.

**6. CONTRAINDICACIONES**

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

**7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Se debe advertir al paciente, que durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales habitualmente desaparecen al continuar con el tratamiento. No obstante, si la agravación se prolonga más allá de una semana o si es muy severa, debe suspender la administración y consultar al médico.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ECHIPROP  
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES



Por tratarse de gotas hidroalcohólicas, su uso en menores de 12 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no está indicado.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

**8. EMBARAZO Y LACTANCIA**

Ver Advertencias y Precauciones.

**9. REACCIONES ADVERSAS**

No descritas.

**10. INTERACCIONES**

No descritas.

**11. TOXICOLOGÍA**

No descritas a estas diluciones.

**12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA**

**Vía de Administración:** Oral

**Posología:**

Adultos: en caso de molestias agudas: administrar 5 a 10 gotas cada media a una hora, máximo 12 veces al día o hasta que los síntomas desaparezcan.

Cuando mejoren las molestias, administre 10 gotas 1 a 3 veces al día.

**Duración del Tratamiento:** No administrar por más de una semana. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

**Modo de Uso:** Se recomienda tomar el medicamento media hora antes o después de las comidas. Disuelva las gotas en un vaso de agua.

**13. PERIODO DE EFICACIA**

~~60~~ 36 meses

**14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Conservar a no más de 25°C.

**15. CONDICIÓN DE VENTA**

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

**Elaborado y Distribuido** por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, **Belloto Norte**, Quilpué, Chile. ([www.knop.cl](http://www.knop.cl))