

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
GASTROK GLÓBULOS



**FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**

**GASTROK**  
**GLÓBULOS**

**1. COMPOSICIÓN.**

Cada 100 g de glóbulos contiene:

Calcium phosphoricum C6	0,20 mL
Cinchona succirubra C6	0,20 mL
Hydrastis canadensis C6	0,20 mL
Lycopodium clavatum C6	0,20 mL
Strychnos nux vomica C6	0,20 mL
Glóbulos de Sacarosa	100 g

**2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA**

Medicamento Homeopático.

**3. MECANISMO DE ACCIÓN**

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

**4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.**

A continuación se describen las principales observaciones de la patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

**Calcium phosphoricum**: Alteraciones del apetito. Estados de déficit de Calcio. Estados de agotamiento.

**Cinchona succirubra**: Debilitamiento general, diarrea aguda, indigestión.

**Hydrastis canadensis**: Inflamación y cólicos del sistema gastrointestinal y hepato-biliar.

**Lycopodium clavatum**: Inflamación y trastornos del sistema hepato-biliar, trastornos digestivos, enfermedades metabólicas, alteraciones del comportamiento y anímicas.

**Strychnos nux vomica**: Molestias debido a la alimentación. Inflamación y espasmos gastrointestinales, trastornos hepáticos y biliares.

**5. INDICACIONES**

**Medicamento homeopático útil como coadyuvante** en el tratamiento de los síntomas de gastritis en niños.

**6. CONTRAINDICACIONES**

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

**7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales desaparecerán al continuar con el tratamiento.

Mantener fuera del alcance de los niños.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
GASTROK GLÓBULOS****8. EMBARAZO Y LACTANCIA**

No existen restricciones para el uso indicado.

**9. REACCIONES ADVERSAS**

No descritas.

**10. INTERACCIONES**

No descritas.

**11. TOXICOLOGÍA**

No descritas a estas diluciones.

**12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA**

**Vía de Administración:** Uso Oral

**Posología:**

Niños menores de 1 año de edad: en caso de molestias agudas, administre 3 glóbulos cada hora hasta un máximo de 12 veces al día.

Cuando mejoren las molestias, administre 5 glóbulos 3 veces por día.

Niños entre 1 y 6 años de edad: en caso de molestias agudas, administre 5 glóbulos cada hora, hasta un máximo de 12 veces al día.

Cuando mejoran las molestias, administre 10 glóbulos 3 veces al día.

Niños entre 6 años y 12 años edad: en caso de molestias agudas, administre 8 glóbulos cada hora, hasta un máximo de 12 veces al día.

Cuando mejoran las molestias, administre 10 glóbulos 3 veces al día

**Duración del Tratamiento:** No administrar por más de una semana. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

**Modo de Uso:** Los glóbulos deben tomarse media hora antes de las comidas, permitiendo que se disuelvan lentamente en la boca. En bebés y niños muy pequeños disuelva los glóbulos en un poco de agua antes de su administración.

**13. PERIODO DE EFICACIA**

24 ~~60~~ meses

**14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Conservar a no más de 25°C.

**15. CONDICIÓN DE VENTA**

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

**Elaborado y Distribuido** por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Quilpué, Chile.  
([www.knop.cl](http://www.knop.cl))