

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
LYMPHOMYOSOT N SOLUCIÓN INYECTABLE****Folleto de información al Profesional**

Solución inyectable

Lymphomyosot N

Medicamento homeopático

Vía im;sc;id; iv

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS
05 JUN 2014
N° Ref.: RF522106/14
N° Registro: H-1214/14
Firma Profesional: [Firma]

Composición: Cada ampolla de 1,1 ml contiene: *Myosotis arvensis* D3 0,55 mg; *Veronica officinalis* D3 0,55 mg; *Teucrium scorodonia* D3 0,55 mg; *Pinus sylvestris* D4 0,55 mg; *Gentiana lutea* D5 0,55 mg; *Equisetum hyemale* D4 0,55 mg; *Smilax* D6 0,55 mg; *Scrophularia nodosa* D3 0,55 mg; *Calcium phosphoricum* D12 0,55 mg; *Natrium sulfuricum* D4 0,55 mg; *Fumaria officinalis* D4 0,55 mg; *Levothyroxinum* D12 0,55 mg; *Araneus diadematus* D6 0,55 mg; *Geranium robertianum* D4 1,10 mg; *Nasturtium officinale* D4 1,10 mg; *Ferrum jodatatum* D12 1,10 mg. Excipientes: cloruro de sodio, agua para inyectables c.s. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Indicación: Medicamento útil como regulador linfático.

Advertencias: Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, lo cual es pasajero y no reviste mayor importancia. No use dosis mayores a las recomendadas, ni use el medicamento por más tiempo del recomendado. El uso en embarazo y lactancia debe realizarse con especial orientación médica.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes. No usar en niños menores de 12 años.

Precaución: El tratamiento debe realizarse con especial precaución en pacientes con enfermedades tiroideas.

Efectos secundarios: No se han descrito. **No obstante, si se observa cualquier efecto secundario durante el tratamiento, debe comunicárselo al médico o químico farmacéutico.**

Interacciones con otros medicamentos: Si bien no se han descrito, el efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
LYMPHOMYOSOT N SOLUCIÓN INYECTABLE**

Modo de uso: El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es en estados agudos: una ampolla al día. El uso por más de una semana debe ser consultado con el médico. En estados crónicos: una ampolla 1-3 veces por semana, reduciendo la frecuencia de administración según se observe mejoría de los síntomas.

Vía de administración:

Intravenoso (i.v.), intramuscular (i.m.), subcutánea (s.c.).

Presentación: Estuche con 5 ampollas de 1,1 ml de solución inyectable cada una.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar a no más de 25°C. Proteger del calor y la luz solar directa. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener lejos del alcance de los niños.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition 1978; Vannier L.; Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homéopathique; Editions Boiron, France, 1993; Reckeweg H.H.; Materia Médica; Homeopatía Antihomotóxica. Una farmacología selectiva; Vol. 1; 2a Ed.; Aurelia-Verlag; Baden-Baden, 1991.

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Av. Eliodoro Yáñez 1618
Providencia - Santiago, Chile

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL