

Ref.: MT1080893/18

Reg.I.S.P. N° H-729/15

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
TRAUMEEL S COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

Folleto de Información al Profesional

X comprimidos sublinguales

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
SECCIÓN PRODUCTOS NUEVOS

22 ABR 2020

N° Ref.: MT1080893/18
N° Registro: H-729/15
Firma Profesional: _____

Traumeel® S comprimidos sublinguales

Medicamento homeopático
Hecho en Alemania

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: *Arnica montana* D2 15 mg; *Calendula officinalis* D2 15 mg; *Hamamelis virginiana* D2 15 mg; *Achillea millefolium* D3 15 mg; *Atropa belladonna* D4 75 mg; *Aconitum napellus* D3 30 mg; *Mercurius solubilis Hahnemanni* D8 30 mg; *Hepar sulfuris calcareum* D8 30 mg; *Chamomilla recutita* D3 24 mg; *Symphytum officinale* D8 24 mg; *Bellis perennis* D2 6 mg; *Echinacea angustifolia* D2 6 mg; *Echinacea purpurea* D2 6 mg; *Hypericum perforatum* D2 3 mg. Como excipientes: estearato de magnesio y lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Indicación: Medicamento útil en el tratamiento del dolor y la inflamación leve a moderada, asociada a traumatismo y otros procesos inflamatorios y degenerativos.

Usos: Tratamiento de los síntomas como dolor e inflamación debido a lesiones de diverso tipo (deportes, accidentes), como: esguinces, distorsiones, contusiones, hematomas, fracturas óseas, etc.; procesos degenerativos con inflamaciones y supuraciones asociadas a diferentes órganos y tejidos (por ejemplo parodontitis, gingivitis, parodontosis); también en el aparato locomotor y ligamentos (tendo vaginitis, bursitis, brazo de tenista), artrosis de la cadera, rodilla y pequeñas articulaciones.

Modo de uso:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis pediátricas

6 -11 años	1 comprimido 2 veces al día
2 - 5 años	1 comprimido 1 a 2 veces al día
< 2 años	1 comprimido al día

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
TRAUMEEL S COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años

1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Dosis Pediátrica Aguda:

6 -11 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2 - 5 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

< 2 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 4 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Advertencias:

- En caso de contusiones o lesiones agudas muy dolorosas, o si los síntomas de inflamación y dolor persisten o empeoran, luego de 3 días de tratamiento, se deberá consultar al médico.
- Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.
- No se deben usar dosis mayores a las recomendadas.

Contraindicaciones:

- Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.
- No utilizar en enfermedades sistémicas como: tuberculosis, leucosis, colagenosis, esclerosis múltiple, enfermedad de SIDA, infecciones VIH y otras enfermedades autoinmunes que requieren otro tipo de tratamiento.

Interacciones con otros medicamentos:

No se conocen.

Efectos secundarios:

- Tras su empleo es posible la aparición de irritación de la mucosa bucal o sialorrea (excesiva salivación), si esto ocurre deberá suspender el tratamiento.
- En casos aislados pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad o alergia.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

Ref.: MT1080893/18

Reg.I.S.P. N° H-729/15

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
TRAUMEEL S COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

Precaución: Este medicamento contiene lactosa.

Vía de administración: Sublingual.

Presentación: Envase con X ~~50~~ comprimidos sublinguales.

Bibliografía:

German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978; Reckeweg, H.H.;
Materia Médica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden-Baden, Aurelia Verlag; 1991.

Reg. I.S.P. N°.:H-729

Fabricado por y bajo licencia

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg – Str 2-4
76532 Baden - Baden
Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos 260, piso 6
Las Condes - Santiago . Chile

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL