

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DIARRHEEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

-Heel

**Folleto de Información al Profesional**

X comprimidos sublinguales

**Diarrheel SN comprimidos sublinguales**

Medicamento homeopático  
Hecho en Alemania

**Composición:**

Cada comprimido sublingual contiene: Argentum nitricum D8 30 mg; Acidum arsenicosum D8 30 mg; Colchicum autumnale D6 30 mg; Citrullus colocynthis D6 30 mg; Hydrargyrum bichloratum D8 30 mg; Podophyllum peltatum D6 30 mg; Veratrum album D4 30 mg. Como excipientes: estearato de magnesio y lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Indicaciones:** Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de diarreas agudas y crónicas.

**Modo de uso:**

Las dosis recomendadas son:

**Dosis estándar**

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.

**Dosis pediátricas**

6 -11 años                    1 comprimido 2 veces al día  
2 - 5 años                    1 comprimido 1 a 2 veces al día

**Dosis aguda o inicial**

Adultos y niños mayores de 12 años

1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Dosis Pediátrica Aguda:

6 -11 años,                    1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SECCIÓN PRODUCTOS NUEVOS  09 AGO 2019  N° Ref.: MT1054691/18 N° Registro: A-1117/17 Firma Profesional:
---

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DIARRHEEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

**-Heel**

2 - 5 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

**En el caso de niños menores de 6 años se debe disolver previamente los comprimidos en un poco de agua, para prevenir eventuales problemas de deglución.**

**Contraindicaciones:**

- No administrar en caso de alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.

**Precauciones y Advertencias:**

**En las enfermedades diarreicas, especialmente en niños, la reposición de líquidos y electrolitos debe considerarse la medida terapéutica más importante. La diarrea en bebés y niños pequeños requiere consulta con el médico. Los adultos también deben consultar al médico por diarrea que dure más de 2 días, presencia de sangramiento digestivo, aumento de temperatura y diarrea recurrente.**

**Efectos secundarios:**

- No se han descrito en la bibliografía.

**Interacciones con otros medicamentos:**

- No se han descrito en la bibliografía.

**Vía de administración:** Sublingual.

**Presentación:** Envase con 50 comprimidos sublinguales.

**Condiciones de Almacenamiento:**

- Mantener el frasco, bien cerrado, a no más de 25° C, protegido de la luz y la humedad.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

**Bibliografía:**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DIARRHEEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

**-Heel**

Homöopathisches Arzneibuch (HAB); German Homeopathic Pharmacopoeia; Translation of the 5th Supplement (1991) to the 1978 edition; Official edition; Deutscher Apotheker-Verlag Stuttgart; Reckeweg, H.-H.; Materia Medica; Homeopathia Antihomotoxica, Una Farmacología selectiva; Vol. 1; 2° ed., Aurelia-Verlag; Baden-Baden; 1991. Vannier Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homéopathique; Boiron, France 1993..

Reg. I.S.P. N°.:H-1117

**Fabricado por y bajo licencia**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg – Str 2-4  
76532 Baden - Baden  
Alemania

**Importado y distribuido por:**

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.  
Encomenderos 260, piso 6  
Las Condes - Santiago . Chile

