

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
 GASTRICUMEEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES
Folleto de Información al Profesional

X comprimidos sublinguales

Gastricumeel® comprimidos sublinguales

Medicamento homeopático
 Hecho en Alemania

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SECCIÓN PRODUCTOS NUEVOS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">17 JUL 2019</div> N° Ref.: <u>MT1080866/18</u> N° Registro: <u>H-950/16</u> Firma Profesional: <u>[Firma]</u>
--

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: ~~Argentum nitricum D6 30 mg;~~
~~Acidum arsenicosum D6 30 mg;~~ ~~Pulsatilla pratensis D4 60 mg;~~ ~~Strychnos nux vomica~~
~~D4 60 mg;~~ ~~Carbo vegetabilis D6 60 mg;~~ ~~Stibium sulphuratum nigrum D6 60 mg.~~
 Como excipientes: ~~estearato de magnesio y lactosa.~~ Elaborado conforme a las
~~normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).~~ De acuerdo a última
fórmula autorizada en el Registro Sanitario

Indicaciones: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en casos el
tratamiento de gastritis aguda y crónica, pirosis, meteorismo.

Modo de uso:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándarAdultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.**Dosis pediátricas**6 -11 años 1 comprimido 2 veces al día2 - 5 años 1 comprimido 1 a 2 veces al día< 2 años 1 comprimido al día**Dosis aguda o inicial**

Adultos y niños mayores de 12 años

1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis
estándar

Dosis Pediátrica Aguda:

6 -11 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego
continúe con dosis estándar.2 - 5 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego
continúe con dosis estándar.< 2 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 4 veces al día, y luego
continúe con dosis estándar.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
 AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
GASTRICUMEEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

Advertencias:

- No use dosis mayores ni por más tiempo del recomendado. Si los síntomas se mantienen o intensifican después de 3 días de tratamiento, consulte al médico.
- La seguridad y eficacia del uso de este medicamento durante el embarazo o la lactancia, no se ha establecido, por lo que se recomienda administrar bajo supervisión médica en dichos casos.
- Puede aparecer un agravamiento inicial de los síntomas, si esto ocurre se deberá suspender el tratamiento y consultar al médico.

Contraindicaciones:

- No administrar en caso de antecedentes de alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.

Efectos secundarios:

- No se han descrito en la bibliografía.

Interacciones con otros medicamentos:

- No se han descrito en bibliografía.

Precaución: Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes diabéticos.

Vía de administración: Sublingual.

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Condiciones de Almacenamiento:

- Proteger del calor, de la luz solar directa y de la humedad.
- Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso.
- Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 25 °C, protegido de la luz y la humedad.
- No use después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
- Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
GASTRICUMEEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

Bibliografía:

German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978. Vannier; Poirier J.; Precis de Matière Medicale Homeopatique; Ed. Boiron, 1985. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

Reg. I.S.P. N°.: H-950

Fabricado por y bajo licencia

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg – Str 2-4
76532 Baden - Baden
Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos 260, piso 6
Las Condes - Santiago . Chile

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

