

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 73 SPONDARTHIN SOLUCIÓN
INYECTABLE

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg Rekin 73 Spondarthrin Solución inyectable.

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Composición: Cada 2 g contiene:

Acidum sulfuricum D6 0,4 g, Argentum metallicum D12 0,2 g, Arnica D4 0,4 g, Bryonia D4 0,4 g, Casuticum Hahnemanni D12 0,2 g, Ledum D4 0,4 g, solución isotónica de cloruro de sodio cantidad suficiente.

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución inyectable.

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de la artrosis.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Inyección vía subcutánea o intravenosa.

Posología: Por lo general, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa de 1 a 3 veces por semana. En casos agudos, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa 1 vez al día.

4.3 Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a las flores de la familia de las compuestas.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

El uso del producto en niños no está bien documentado. Por lo tanto, no debe usarse en niños menores de 12 años

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se han reportado.

4.6 Embarazo y lactancia:

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 73 SPONDARTHRIIN SOLUCIÓN
INYECTABLE

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos.

Como no hay suficiente experiencia documentada sobre el uso durante el embarazo y la lactancia, el producto sólo debe usarse después de consultar al médico.

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos, DR. RECKEWEG REKIN 73 Spondarthrin solución inyectable, puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el medicamento.

En caso de uso parenteral, se debe tener en consideración la posibilidad de un agravamiento inicial.

Cuando se administra por vía subcutánea, puede ocurrir eritema cutáneo en el lugar de la inyección.

4.9 Sobredosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A.- Acidum sulfuricum

Origen: químico

Usos medicinales: Artrosis, dolores de las articulaciones, disminución de la fuerza muscular.

B.- Argentum metallicum

Origen: químico

Usos medicinales: Dolores de las articulaciones, región lumbar dolorida, contusiones dolorosas, rigidez de las articulaciones.

C.- Arnica

Origen: vegetal

Usos medicinales: Mialgia, dolores musculares, neuralgia, bursitis. Músculos y articulaciones como golpeados.

D.- Bryonia

Origen: vegetal

Usos medicinales: Predisposición para derrames y tumefacción. Reumatismo. Dolores.

E.- Causticum Hahnemanni

Origen: químico

Usos medicinales: Enfermedades reumáticas. Articulaciones rígidas, dolor en la espalda como una herida, sensación de ardor en las articulaciones.

F.- Ledum