

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
MIGRAPLEX COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**



FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

**MIGRAPLEX
COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

1. COMPOSICIÓN

Cada comprimido de 180 mg contiene:

<i>Atropa belladonna</i> C9	0,2 mg
<i>Carbo vegetabilis</i> C9	0,2 mg
<i>Gelsemium sempervirens</i> C9	0,2 mg
<i>Iris versicolor</i> C9	0,2 mg
<i>Natrium sulfuricum</i> C9	0,2 mg
Excipientes:	
Celulosa Microcristalina, Crospovidona, Estearato de	
Magnesio, Dióxido de silicio coloidal, Lactosa	
Manitol compresión directa csp	180 mg

2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA

Medicamento Homeopático.

3. MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.

A continuación se describen las principales observaciones de la Patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

Gelsemium sempervirens: cefaleas, trastornos nerviosos

Atropa Belladonna: inflamación órganos

Carbo vegetabilis: Insuficiencia circulatoria

Natrium sulfuricum: Secuelas de traumas neurológicos.

Iris versicolor: Migraña. Neuralgia de cara

5. INDICACIONES

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de síntomas de cefaleas, migrañas y neuralgias.

6. CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
MIGRAPLEX COMPRIMIDOS SUBLINGUALES****7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Se debe advertir al paciente, que durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales habitualmente desaparecen al continuar con el tratamiento. No obstante, si la agravación se prolonga más allá de una semana o si es muy severa, debe suspender la administración y consultar al médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

8. EMBARAZO Y LACTANCIA

No existen restricciones para el uso indicado.

9. REACCIONES ADVERSAS

No descritas.

10. INTERACCIONES

No descritas.

11. TOXICOLOGÍA

No descritas a estas diluciones.

12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía de administración: Uso sublingual

Posología: Adultos y Niños mayores de 12 años: en caso de molestias agudas, administre 1 comprimido cada hora, hasta un máximo de 6 veces al día. Cuando mejoren las molestias, administre 1 comprimido 3 veces por día.

Duración del Tratamiento: Si no hay mejoría en un plazo de 2 a 3 días o si presentan otros síntomas, debe suspender su uso y consultar a su médico.

Modo de Uso: Los comprimidos deben disolverse bajo la lengua

13. PERIODO DE EFICACIA

~~36~~ 24 meses

14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30°C.

15. CONDICIÓN DE VENTA

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

Elaborado y Distribuido por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Quilpué, Chile.
(www.knop.cl)