

Ref.: RF1215375/19 Reg. I.S.P. N° H-1273/20
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 20 EUGLANDIN-F SOLUCIÓN
INYECTABLE

**FOLLETO DE INFORMACION AL
PROFESIONAL**

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg Rekin 20 Euglandin-F Solución inyectable.

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Composición: Cada 2 g contiene:

Glandula suprarenalis (suis) D12 0,2 g, Glandula Thymi (suis) D12 0,2 g, Hypophysis (suis) D12 0,2g, Ovarinum (suis) D12 0,2 g, Pancreas (suis) D12 0,2 g, Tyreoidinum (suis) D12 0,2 g, cloruro de sodio cantidad suficiente.

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución inyectable.

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático usado como coadyuvante en trastornos endocrinos de la mujer.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Inyección vía subcutánea o intravenosa.

Posología: Por lo general, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa de 1 a 3 veces por semana.

4.3 Contraindicaciones:

No se han reportado.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En enfermedades de tiroides este medicamento sólo debe usarse bajo vigilancia médica.

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

Durante el embarazo o la lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

La administración simultánea de medicamentos para la tiroides sólo debe hacerse bajo estricta vigilancia médica.

4.6 Embarazo y lactancia:

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos.

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos, DR. RECKEWEG REKIN 20 Euglandin-F solución inyectable, puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el medicamento.

En caso de uso parenteral, se debe tener en consideración la posibilidad de un agravamiento inicial.

Cuando se administra por vía subcutánea, puede ocurrir eritema cutáneo en el lugar de la inyección.

4.9 Sobredosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A.- *Glándula suprarenalis (suis)*

Origen: animal

Usos medicinales: Estados de fatiga, falta de energía.

B.- *Glándula thymi (suis)*

Origen: animal

Usos medicinales: Trastornos del crecimiento y desarrollo.

C.- *Hypophysis (suis)*

Origen: animal

Usos medicinales: Mareo, trastornos del sistema endocrino, trastornos menstruales y de la ovulación.

D.- *Ovarinum (suis)*

Origen: animal

Ref.: RF1215375/19 Reg. I.S.P. N° H-1273/20
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 20 EUGLANDIN-F SOLUCIÓN
INYECTABLE

Usos medicinales: Trastornos de la función ovárica, dismenorrea, menorragia, molestias climatéricas.

E.- *Pancreas (suis)*

Origen: animal

Usos medicinales: Dificultad para concentrarse, irritabilidad premenstrual, molestias menstruales, fatiga.

F.- *Thyreoidinum (suis)*

Origen: animal

Usos medicinales: Trastornos tiroideos, obesidad o emaciación, debilidad.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION:

Ampollas de vidrio (calidad hidrolítica Tipo I), con 2 mL de contenido.

Estuches de ~~X 10~~ ampollas y ~~100~~ ampollas.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C

Fabricado en Alemania

Como producto semiterminado por Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH

Industriestr. 3, Melsungen, Hessen, 34212

Acondicionado por Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim · www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

Farmacéutica Caribbean Ltda.

Luis Alberto Cruz N° 1165, Renca, Santiago

por cuenta de:

Escollanos Medicamentos Biológicos y

Compañía Ltda. General Holley 133,

Providencia

Santiago