

Ref.: RF1215374/19 Reg. I.S.P. N° H-1274/20
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 25 PROSTATAN SOLUCIÓN
INYECTABLE

**FOLLETO DE INFORMACION AL
PROFESIONAL**

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg Rekin 25 Prostatan Solución inyectable.

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Composición: Cada 2 g contiene:

Chimaphila unbellata D5 0,2 g, *Clematis vitalba* D3 0,2 g, *Conium* D5 0,2 g, *Ferrum picricum* D6 0,2 g, *Pareira brava* D6 0,2 g, *Populus tremuloides* D4 0,2 g, *Pulsatilla* D4 0,2 g, *Sabal serrulatum* D4 0,2 g, cloruro de sodio cantidad suficiente.

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución inyectable.

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático usado como coadyuvante en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y sus síntomas".

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Inyección vía subcutánea o intravenosa.

Posología: Por lo general, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa de 1 a 3 veces por semana. En casos agudos, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa 1 vez al día.

4.3 Contraindicaciones:

No se han reportado.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

Sólo para hombres mayores de 18 años.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ref.: RF1215374/19 Reg. I.S.P. N° H-1274/20
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 25 PROSTATAN SOLUCIÓN
INYECTABLE

No se han reportado.

4.6 Embarazo y lactancia:

No aplica.

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos, DR. RECKEWEG REKIN 25 Prostatan solución inyectable, puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el medicamento.

En caso de uso parenteral, se debe tener en consideración la posibilidad de un agravamiento inicial.

Cuando se administra por vía subcutánea, puede ocurrir eritema cutáneo en el lugar de la inyección.

4.9 Sobredosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A.- *Chimaphila umbellata*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Inflamación de la próstata, disuria, nicturia.

B.- *Clematis vitalba*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Várices.

C.- *Conium*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Glándulas inflamadas, hipertrofia prostática, nicturia. Salida de la orina con flujo lento, emisión de orina muy difícil.

D.- *Ferrum picrinicum*

Origen: químico

Usos medicinales: Inflamación, agrandamiento de la próstata, ardor al orinar.

E.- *Pareira brava*

Origen: vegetal

Ref.: RF1215374/19 Reg. I.S.P. N° H-1274/20
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 25 PROSTATAN SOLUCIÓN
INYECTABLE

Usos medicinales: Agrandamiento de la próstata, micción frecuente, dolor al orinar, trastornos del vaciamiento de la vejiga.

F.- *Populus tremuloides*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Hiperplasia prostática, retención urinaria incipiente.

G.- *Pulsatilla*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Dolor durante y después de orinar, trastornos en la micción. La orina se libera sólo en gotas y con un flujo interrumpido. Próstata agrandada.

H.- *Sabal serrulatum*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Hiperplasia prostática, problemas de micción, irritación de los órganos urogenitales.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION:

Ampollas de vidrio (calidad hidrolítica Tipo I), con 2 mL de contenido.

Estuches de ~~X 10 ampollas y 100 ampollas.~~

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C

Fabricado en Alemania

Como producto semiterminado por Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH

Industriestr. 3, Melsungen, Hessen, 34212

Acondicionado por Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim · www.reckeweg.de

Ref.: RF1215374/19 Reg. I.S.P. N° H-1274/20
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 25 PROSTATAN SOLUCIÓN
INYECTABLE

Importado y Distribuido en Chile por:

Farmacéutica Caribbean Ltda.

Luis Alberto Cruz N° 1165, Renca, Santiago

por cuenta de:

Escollanos Medicamentos Biológicos y

Compañía Ltda. General Holley 133,

Providencia

Santiago