


FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

PANADOL ADULTOS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Paracetamol 500 mg



1. Composición :

Cada comprimido recubierto contiene: Paracetamol 500 mg. **Excipientes:** Almidón pregelatinizado, Almidón de maíz, Talco, Polividona, Sorbato de potasio, Acido esteárico, Hipromelosa, Triacetina, trazas de colorante FD&C azul N°1.

2.- Clasificación: Analgésico – Antipirético.

3. Indicaciones:
Panadol Adultos contiene paracetamol que es un analgésico y antipirético.


4. Usos:
 Panadol Adultos es efectivo para :
 ▪ El tratamiento del dolor leve a moderado incluyendo :
 Dolor de cabeza, migraña, dismenorrea, dolor de garganta, dolores musculares, fiebre y dolor después de una vacuna, dolores dentales, **osteoartritis**, El alivio de la fiebre.

5. Efectos adversos:

Suspenda el uso de este medicamento y consulte a su médico inmediatamente si:

- Aparece algún tipo de reacción alérgica como erupción cutánea o picazón o descamación de la piel, con o sin dificultades para respirar, o hinchazón de los labios, lengua, garganta o cara, o úlceras en la boca.
- Presenta moretones o sangrado sin causa aparente.
- Ud. ha experimentado dificultad respiratoria con Acido Acetilsalicílico u otros AINEs y experimenta una reacción similar con este producto.

Estas reacciones son raras.



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

6. Contraindicaciones:

Contraindicado en personas con hipersensibilidad conocida al paracetamol o a alguno de los otros componentes de la fórmula.

No administrar a personas que sufran de enfermedad hepática o renal grave.

7. Precauciones y Advertencias:

- a) El uso prolongado y de altas dosis de paracetamol puede provocar severo daño hepático
- b) Consulte con el médico antes de usar este medicamento, si tiene problemas al hígado o al riñón, en caso de sufrir alguna otra enfermedad, tomar otros medicamentos o requerir atención médica por otras razones.
- c) Si los síntomas no mejoran consulte a su médico.
- d) Dosis máxima diaria : 4 g
- e) No exceda la dosis recomendada
- f) No administrar por más de 5 días en caso de dolor, por más de 3 días en caso de fiebre, o por más de 2 días en caso de dolor de garganta, sin consultar al médico.
- g) Mantenga un intervalo de dosis mínimo de 4 hrs entre dosis
- h) No administrar a niños menores de 12 años sin antes consultar dosis al médico.
- i) No tomar con otros productos que contengan paracetamol
- j) Mantener fuera del alcance de los niños.

8. Interacciones:

Las drogas inductoras de las enzimas hepáticas (como por ejemplo fenobarbital, fenitoína, carbamazepina) y alcohol pueden aumentar la hepatotoxicidad del paracetamol.

Si está bajo tratamiento con warfarina u otro anticoagulante consulte a su médico antes de usar este medicamento; ya que el riesgo de sangrado puede verse aumentado por el uso diario, regular y prolongado de paracetamol.

Dosis ocasionales de paracetamol, no tienen efecto significativo.

9. Sobredosificación:

Si ud toma mas medicamento del que debería, acuda inmediatamente por asistencia médica debido al riesgo de falla hepática.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL


10. Posología y modo de uso:

Adultos y mayores de 12 años: 1 a 2 comprimidos recubiertos de 500 mg 3 a 4 veces al día. Máximo 8 comprimidos (4 g) al día. Mantenga un intervalo de dosis mínima de 4 hrs.

11. Condiciones de almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente, lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.



1551
1552