

Ref. N°5470/10

Reg. ISP N° H-1191/11

Deutsche Homöopathie-Union
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL
PROFESIONAL

ESTOMAKIND
COMPRIMIDOS

Fecha de edición: 04-2010
Página : 1/5

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Estomakind comprimidos

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

1 comprimido (100 mg) contiene:

Active substances:

Arsenicum album D6	20 mg
Croton tiglium D6	20 mg
Okoubaka D4	20 mg
Veratrum album D12	20 mg

Excipientes:

Para una lista completa de los excipientes, vea el apartado 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Comprimidos


4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas

Coadyuvante en trastornos gastrointestinales infantiles que cursan con náuseas, vómitos y diarrea.

~~Tratamiento de trastornos de la función gastrointestinal en niños, también de temprana edad, resultantes en náusea, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Estas molestias pueden deberse a cambios de la nutrición tales como:~~

- ~~— cambio de la lactancia a la papilla~~
- ~~— introducción de alimentos sólidos (p. ej. verduras, frutas, carne)~~
- ~~— comienzo de comidas precocinadas en guarderías y escuelas~~
- ~~— consumo de comida poco familiar durante viajes~~



FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

Ref. N°5470/10

Reg. ISP N° H-1191/11

Deutsche Homöopathie-Union
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL
PROFESIONAL

ESTOMAKIND
COMPRIMIDOS

Fecha de edición: 04-2010
Página : 2/5

4.2 Posología y forma de administración

Niños menores de 1 año de edad: En caso de molestias agudas, se administra 1 comprimido cada hora, hasta un máximo de 6 comprimidos por día.

Cuando mejoran los síntomas, se administra 1 comprimido 4 veces por día.

Niños entre 1 y 6 años de edad: En caso de molestias agudas, se administran 2 comprimidos cada hora hasta un máximo de 12 comprimidos por día.

Cuando mejoran los síntomas, se administran 2 comprimidos 4 veces por día.

Los comprimidos deben tomarse media hora antes o media hora después de las comidas, admitiendo que se disuelvan lentamente en la boca. Si fuera necesario, los comprimidos deben disolverse en un poco de agua.

4.3 Contraindicaciones

Hipersensibilidad a una de las sustancias activas o a uno de los excipientes.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

Si no se produce ninguna mejora dentro de **2 a 3** días o si las molestias recurren frecuentemente, conviene revalorar la terapia.

Este medicamento contiene lactosa, empleada como portador de trituraciones homeopáticas. Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lapp lactosa o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se han observado interacciones con otros medicamentos. El uso de este medicamento homeopático no excluye el uso de otros medicamentos.

4.6 Embarazo y lactancia

Este medicamento ha sido concebido para niños.

Deutsche Homöopathie-Union Alemania	FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL
ESTOMAKIND COMPRIMIDOS	Fecha de edición: 04-2010 Página : 3/5

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Este medicamento ha sido concebido para niños.

4.8 Reacciones adversas

Hasta ahora no se han observado efectos colaterales. Si se aprecian efectos colaterales, deben iniciarse medidas adecuadas.

~~Molestias existentes podrían empeorar transitoriamente durante el uso de medicamentos homeopáticos (empeoramiento inicial). En tales casos, debe suspender la medicación y consultar a su médico.~~

Con el uso de los medicamentos homeopáticos se puede producir una agravación inicial de los síntomas existentes, en cuyo caso se debe suspender la administración y consultar al médico.

4.9 Sobredosis

No se ha informado sobre ningún caso de sobredosificación.


5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Grupo farmacoterapéutico: medicamento homeopático

La terapia homeoterapia se distingue marcadamente de la medicina convencional con respecto al entendimiento de la enfermedad y al uso de medicamentos. Los remedios homeopáticos estimulan los mecanismos de defensa propios del organismo, activando con ello su poder de autocuración. La reacción del organismo a un remedio homeopático es sumamente individual. Por este motivo, no pueden determinarse efectos farmacológicos específicos de la dosis, ni tampoco datos farmacodinámicos o farmacocinéticos.

5.1 Propiedades farmacodinámicas

No corresponde



Ref. N°5470/10		Reg. ISP N° H-1191/11	
Deutsche Homöopathie-Union Alemania		FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL	
ESTOMAKIND COMPRIMIDOS		Fecha de edición: 04-2010 Página : 4/5	

5.2 Propiedades farmacocinéticas

No corresponde

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

No corresponde. Los comprimidos Estomakind, como medicamento homeopático de uso ampliamente establecido, no han sido sometidos a ensayos preclínicos.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Celulosa microcristalina, talco, estearato de magnesio.

6.2 Incompatibilidades

No corresponde

6.3 Período de validez

~~30~~ 24 meses

6.4 Precauciones especiales de conservación

Mantenga el medicamento fuera del alcance y de la vista de niños.

No almacenar por sobre los 25° C. Guardar en el envase original.

6.5 Naturaleza y contenido del envase

Comprimidos; envasados en un frasco de vidrio con un contenido de 150 comprimidos.

6.6 Precauciones especiales de eliminación

No existen requerimientos especiales.

Ref. N°5470/10

Reg. ISP N° H-1191/11

Deutsche Homöopathie-Union Alemania	FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL
ESTOMAKIND COMPRIMIDOS	Fecha de edición: 04-2010 Página : 5/5

7. IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y FABRICANTE

Importador: Paracelsus S.A., Carabobo 5930, Vitacura, Santiago.

Fabricante: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co KG, Ottostraße 24
76227 Karlsruhe, Alemania.

Distribuido por Adifa S.A., Alcalde Guzmán 1410, Quilicura, Santiago.



