

REF. RF2057870

REG. I.S.P. N° H-1302/24

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R17 COBRALACTIN SOLUCIÓN PARA
GOTAS ORALES**

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg R17 Cobralactin Solución para gotas orales

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Cada 100 g de Solución Oral contiene:

Acidum lacticum	D4	10 g
Naja tripudians	D6	10 g
Scrophularia nodosa	D4	10 g

Ethanol 30% / Agua purificata c.s.

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución Oral

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en la activación del sistema linfático.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Oral

Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

4.3 Contraindicaciones:

No se han reportado

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

Población pediátrica

No se ha establecido la seguridad y eficacia de este medicamento en niños menores de 18 años de edad.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se han reportado

4.6 Embarazo y lactancia:

Durante el embarazo o la lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos. En todo caso, debe consultar al médico especialista.

REF. RF2057870

REG. I.S.P. N° H-1302/24

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R17 COBRALACTIN SOLUCIÓN PARA
GOTAS ORALES**

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

No se han reportado

4.9 Sobre dosis:

No se han reportado.

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

Acidum lacticum

$C_3H_6O_3$

Origen: químico

Usos medicinales: Glándulas inflamadas en el cuello y axilas. Dolores torácicos con glándulas axilares inflamadas.

Naja tripudians

Origen: animal

Usos medicinales : Edema.

Scrophularia nodosa

Origen: vegetal

Usos medicinales : Endurecimiento de las glándulas, hinchazón de los ganglios linfáticos.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION:

Frasco de vidrio de 22 ml

Frasco de vidrio de 50 ml

Frascos de vidrio (calidad hidrolítica tipo III) marrón

Cuentagotas de polietileno

Tapón de polipropileno

Cierre de seguridad de polietileno

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco a no más de 25°C.

Fabricado y procedente
de

REF. RF2057870

REG. I.S.P. N° H-1302/24

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R17 COBRALACTIN SOLUCIÓN PARA
GOTAS ORALES**

Pharmazeutische Fabrik
Dr. Reckeweg & Co.
GmbH., ubicado en
ubicado en Berliner Ring
N° 32, Bensheim,
Alemania.
·www.reckeweg.de

Importado por: Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda., ubicado en Suecia N°
0142, Providencia, Santiago, Chile.
Distribuido en Chile por: Farmacéutica Caribbean Ltda., ubicado en Luis Alberto Cruz N°1165,
Renca, Santiago, Chile.
por cuenta de: Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda., ubicado en Avenida
Suecia 0142 Oficina 202, Providencia, Santiago.